1914 5 fr.

DICTIONNAIRE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES


(Fiches Pharmacologiques)

VIDAL et GEORGE


1914 3 fr.

DICTIONNAIRE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

(Fiches Pharmacologiques)



VIDAL et GEORGE
123, Rue Lafayette
PARIS





LETTRE PRÉFACE

MONSIEUR LE DOCTEUR,

L'accueil fait par le corps médical aux **Fiches pharmacologiques** *a été trop bienveillant, trop flatteur aussi, pour que nous ne recherchions pas, dans le domaine qui est le nôtre, tous les moyens de reconnaitre cette faveur et de la mériter mieux encore.*

Un regret nous avait été fréquemment exprimé par les nombreux médecins qui ont bien voulu, dans leurs lettres ou dans les conversations que nous avons eues avec eux, nous donner leur avis sur la façon dont nous avons mis à exécution l'idée de M. le Docteur Perrin (de Nancy) :

« Votre fichier, nous a-t-on dit, rend de grands services pour la prescription des spécialités, mais c'est seulement chez lui que le praticien peut l'utiliser. »

C'est pour répondre à cette remarque et correspondre au désir qu'elle semblait contenir, que nous avons créé le présent **Dictionnaire.**

Il reproduit, sous une forme portative, les **Fiches pharmacologiques** *et nous nous sommes attachés à le rendre aussi pratique et aussi complet dans son genre que l'ont été ses devancières.*

Nous osons croire qu'il recueillera, comme elles, votre entière approbation, si, tel que nous vous le présentons, notre **Dictionnaire** *vous rend quelques services, notre but sera atteint et rien ne nous sera plus agréable.*

L. VIDAL & H. GEORGE.

ACIDE ACÉTOSALICYLIQUE HEYDEN

(COMPRIMÉS)

Dérivé de l'acide salicylique

Comprimés dosés à 0,50 cgr. par unité

Doses et mode d'emploi. — Adultes : dose unique : 1 à 2 comprimés. Dose journalière : jusqu'à 10 comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'acide salicylique sans ses effets secondaires : antirhumatismal et antinévralgique.

Indications. — Rhumatismes musculaires et articulaires, Pleurésie rhumatismale, Névralgies, Maux de tête.

1 fr. 25 le tube de 20 comprimés

Produits HEYDEN

29 et 31, Rue Philippe-de-Girard

PARIS (Xe)

A

ADRÉNALINE BYLA

(Syn : adrénamine)

Délivrée : *Basique* en tubes de 0,50 cgr.
Solution à 1 pour 1000 (flacons de 30 et 15 gr.).

On emploie la solution à 1/1000 dans le badigeonnage des muqueuses et les instillations oculaires; mais on a également recours à des solutions plus étendues, telles que 1/3000, 1/5000 et 1/10000 (Laryngites, Coryza, etc.). La solution hypodermique s'utilise à la dose de 1 à 2 cm³.

La solution-mère à 1/1000 s'administre encore par voie stomacale sous forme de vin ou de sirop à la dose de 5 à 30 gouttes. On peut aussi présenter l'Adrénaline à l'état de pastilles, tablettes ou granules dosés à 1 mgr.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus puissant des hémostatiques connus, énergiquement vaso-constrictive, décongestionnante.

Indications. — Affections de muqueuses, nez, gorge, oreilles, oculaires, cœur; Hémorragies diverses, Dermatoses et en chirurgie opératoire ou dentaire.

1 fr. 50 le flacon de 15 gr.
3 francs le flacon de 30 gr.
3 fr. 50 le tube de 5 cm³

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

A

ÆTHONE $C^7H^{16}O^3$

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.

Posologie. — *Enfants*, administrer à chaque fois : 6 mois à 1 an : 8 à 10 gouttes ; 1 an à 2 ans : 10 à 15 gouttes ; au-dessus de 2 ans : 15 à 30 gouttes et plus selon l'âge et le cas. Répéter les doses ci-dessus cinq à six fois et plus, par 24 heures selon les besoins.

Adultes, 30 à 50 gouttes par dose : administrer 5 à 6 doses et plus par 24 heures, 1/2 heure avant ou 2 heures après le repas.

Avis très important : Il y a intérêt à donner des doses suffisantes ; les insuccès de l'*Æthone* sont dûs aux doses trop faibles. L'*Æthone* n'étant pas toxique, la dose peut être portée jusqu'à somnolence.

Mode d'administration. — L'*Æthone*, très volatil, doit être mélangé au moment du besoin à un peu d'eau, soit sucrée, soit mieux édulcorée de sirop de tolu à la température de la chambre. Il ne doit pas être mis en potion.

P.-S. — En cas de difficulté pour les enfants, l'*Æthone* pourra être administré dans un petit lavement tiède.

Dépôt général : **FALCOZ & C°**
18, rue Vavin, PARIS

A

AIROL "ROCHE"

Combinaison basique de bismuth oxyiodée donnant au contact des plaies de *l'iode à l'état naissant*

Airol. 1° *En poudre* (1 tube, Prix : 1 fr.).
2° *Emulsion d'Airol Roche* à 10 % de glycérine, pour injections uréthrales.
3° *Gaze à l'Airol Roche* à 10 et 20 %.
4° *Pommade à l'Airol Roche* 5 et 10 %.
5° *Pâte à l'Airol Roche* à 20 et 30 %.
6° *ollodion à l'Airol Roche* à 5 et 10 %.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière, toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'Airol est le seul succédané pratique).

Indications. — Toutes celles de l'iodoforme.

F. HOFFMANN LA ROCHE & Cie

21, place des Vosges, PARIS (IVe)

A

AMANDOL

Composition. — Amandes fraîches broyées, sucre cristallisé.

Action. — L'huile des amandes agit comme saturant des acides de l'estomac.

Indications. — Permet de prescrire aux hyperchlorhydriques sous une forme agréable le régime des corps gras.

Forme pharmaceutique. — Bonbons carrés avec addition de sucre chocolaté : 1 à 10 carrés à la fin de chaque repas.

Laboratoire DURET et RABY

MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

A

AMPOULES DE DIGALÈNE

(Digitale injectable)

Seul vrai principe actif de la macération de feuilles fraîches de digitale isolé et étudié par le Prof. Cloetta (de Zurich)

1 cm³ = 0 gr. 003 D. S. Cloetta = 0,15 cgr. de poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. Action très rapide, tolérance parfaite, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation.

(Voir Digalène)

Injections. — Hypodermiques, intraveineuses, intra-musculaires (indolores).

Prix réglementé :

3 fr. la boite de 6 ampoules

F. HOFFMANN LA ROCHE & Cᵒ

21, Place des Vosges, PARIS

ANTACIDOL

Composition. — Carbonate de bismuth chimiquement pur et lait desséché.

Action. — Agit comme saturant des acides de l'estomac et en revêtant la muqueuse d'une fine couche de bismuth.

Indications. — Calme les douleurs des hyperchlorhydriques : est spécialement indiqué dans les cas d'Ulcère de l'estomac et les Gastrorrhagies.

Forme pharmaceutique. — Tablettes comprimées.

Dose. — Un comprimé toutes les 5 minutes jusqu'à soulagement. (Ces comprimés, même à doses élevées, ne constipent pas).

Laboratoire DURET & RABY

MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

A

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution d'iodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique .... 3 gr. 50
Colchicine .... 0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner) 1 gr. environ
Excipient Q s. pr 100 cm³.

Dose et mode d'emploi. — *Accès :* Trois mesures pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. *Forme chronique :* Une à trois demi-mesures suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

(Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action sur le cœur, les reins et l'estomac).

Prix réglementé : 10 francs le flacon
6 francs le 1/2 flacon

PHARMACIE DE LA PLACE ROYALE
à REIMS

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de Solanées nitrées et Menthol

Propriétés. — Les principes volatils qui se dégagent de la combustion de l'Antiasthme Bengalais (vapeurs alcaloïdiques, oxygénées et mentholées), exercent un triple effet *antispasmodique, décongestionnant* et *vaso-constricteur*. Le menthol a, en outre, la propriété de rendre agréable la combustion des solanées et de s'opposer à tout réflexe nauséeux, ce qui fait que l'Antiasthme Bengalais est toujours bien accepté et toléré des malades.

Mode d'emploi. — En disposer sur une assiette un demi-dé à coudre en tas, mettre le feu à une extrémité et, fermant les yeux, respirer la fumée par les narines.

Indications. — *Dyspnée asthmatique, Emphysème, Coryza, Asthme des foins, Bronchites*, etc.

Prix de la boîte (contenance 80 gr. environ) 2 fr. 50. - *Spéc. réglementée*

A. FAGARD, Pharm. prépar.,
23, Av. de la Motte-Piquet, PARIS
(Tél. 700-91) et Princip. Pharm.

A

ANTIGRIPPINE MIDY

(Acéto-Phényl-Salétidine, poudre de Gelsemium et poudre de Dower)

Ni Quinine — Ni Antipyrine

Cachets dosés à 0,75 cgr.

Dose et mode d'emploi. — 1 cach. à distance des repas, dans un grog chaud; renouveler au besoin une heure après.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbature, Névralgies.

Prix : 3 fr. la boîte de 12 cachets

PHARMACIE MIDY
140, Faubourg Saint-Honoré
PARIS (VIIIe)

ASPIRINE VICARIO

Acide acétylsalicylique

Granulée dosée à 0,50 cgr., par cuillerée à café.

Comprimés Vicario dosés à 0,50 cgr. par comprimé.

Dose. — 1 à 4 gr. par jour et plus. Eviter l'administration simultanée des alcalins.

Propriétés thérapeutiques. — Action calmante, Innocuité absolue, Analgésique des douleurs rhumatismales et arthritiques sous toutes les formes, Antithermique chez les tuberculeux et surtout chez les rhumatisants aigus.

Indications. — Toutes les affections rhumatismales : Rhumatisme aigu, Grippe, Goutte, Sciatique, Lumbago.

Prix réglementé :

Granulé, 3 fr. 50 le flacon

Comprimés, 1 fr. 50 le tube

Pour éviter toute substitution :

Exiger la Marque " VICARIO "

Laboratoire VICARIO

17, Boulevard Haussmann, PARIS

AZOTYL

Synthèse, en solution huileuse, des médicaments suivants :

1°) Lipoïdes spléniques et biliaires renforcés par de la cholestérine; 2°) Goménol; 3°) Camphre.

Formes. — *a)* Ampoules injectables de 1 cm³; *b)* Pilules Kératinisées.

Modes d'emploi. — *a)* Injections sous-cutanées et intra-musculaires. Injecter quotidiennement le contenu d'une ampoule pendant 20 jours consécutifs et s'arrêter 10 jours, puis reprendre les piqûres en séries, avec le même repos entre chaque série.

b) Prendre 6 pilules par jour, aux repas de préférence et dans les intervalles des piqûres.

Propriétés. — Exerce une action opothérapique utile en suppléant à l'hypofonctionnement des organes atteints et en excitant leur action physiologique.

Remédie à la déminéralisation des tuberculeux et par suite à l'asthénie et à la déchéance fonctionnelle généralisée consécutive.

Favorise, par les essences, la diapédèse des leucocytes et surtout des leucocytes polynucléaires.

Laboratoire de Thérapie-Bio-Chimique

50, Rue Rennequin, PARIS

B

BAUME DURET

Dermatothérapie. — (Traitement externe). 1° *Baume Duret.*

Formule. — Soufre dissous, goudron, huile de cade vraie, résorcine, gaïacol, menthol en *combinaison* avec le *camphre* et en *dissolution* dans l'*acétone.*

Propriétés. — Antiseptique, analgésique et réducteur, Antiprurigineux puissant, ni toxique, ni irritant (même chez les enfants).

Indications. — *Eczémas* secs ou suintants, avec ou sans lésions cutanées, *Acné, Séborrhéïdes, Impétigo, Sycosis, Gale, etc.*

Mode d'emploi. — En application avec un tampon d'ouate hydrophile dans le cas de lésions, autrement en frictions avec le doigt deux à trois fois par jour, recouvrir de « Bande Duret » tissu pelucheux, n'absorbant pas les corps gras.

Le flacon : 3 fr. 50

La bande Duret : 2 francs

EMPLATRE DURET

à base de Baume Duret et d'oxyde de zinc

Dermatoses localisées; mêmes propriétés que ses composants.

La pochette : 3 francs

Laboratoire de Dermatologie :

PARIS, 10, Rue du Regard

E. VENDEL, Pharmacien de 1re Classe

BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Composition : Menthol et chloral en solution dans de l'essence de Bétula-Lenta obtenue par fermentation et distillation (salicylate de méthyle naturel).

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Propriétés thérapeutiques. — Calme rapidement les douleurs aiguë de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciatiques, douleurs des articulations, névralgies.

Prix réglementé : 5 fr. le flacon

PHARMACIE MIDY

140, faubourg Saint-Honoré

PARIS (VIII[e])

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires
(extraits de la bile de bœuf)

Forme. — Globules kératinisés (digestion intestinale).

Dose. — 6 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indications. — 1° Les causes d'arrêt d'excrétion : lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention.

2° Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

Le flacon de 60 globules : 4 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères
26, boulevard de l'Hôpital PARIS

BIOCALCOSE CHEVRETIN

Liquide et granulé organo-calcique

La Biocalcose, outre une grande quantité de chaux (0 gr. 25 par cuillerée à café) contient encore du phosphore, de la potasse, de la soude, de la magnésie, du manganèse, etc., dans les proportions où ces minéraux se trouvent dans l'organisme sain.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme.

Indications. — Tuberculose, croissance, rachitisme, neurasthénie, dentition, diabète, grossesse.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café jusqu'à 8 ans, 3 à 4 au-dessus de cet âge et chez les adultes. La Biocalcose sera prise dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Prix réglementé :
4 fr. le flacon ou la boîte

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE
24, rue Caumartin, PARIS

BI-IODURE DE MERCURE MIDY

INDOLORE

Selon la formule présentée à la *Société de Thérapeutique*, le 8 Novembre 1905.

Ampoules de 2 cm^3 de solution aqueuse de Hg I^2 à 1 %; chaque cm^3 = 0,01 cgr. de Hg I^2.

Composition :

Hg I^2	0,01
Na I	0,01
Subcutine	0,005
Eau stérilisée	1 cm^3

Cette solution ne précipite pas le sérum, ne coagule pas les albuminoïdes, est anesthésique, supprime les indurations.

Doses. — Chez l'adulte, série de 10 à 20 injections de 1 ou 2 cgr: chez l'enfant, 1 ou 2 mgr. par année d'âge (série de 5).

Mode d'emploi. — Injections profondément intra-musculaires dans le tiers supérieur de la fesse, le malade étant étendu.

5 francs la boîte de 10 ampoules

PHARMACIE MIDY

140, faubourg St-Honoré, PARIS (VIIIe)

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale

(Voir l'étude sur l'Iodogénol)

Gouttes titrées: 20 gouttes contiennent 0.04 cgr. de Brome.

Dose et mode d'emploi. — 20 gouttes de *Bromogénol Pépin* = 0 gr. 50 de Bromures métalliques, à prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

Prix réglementé : 4 fr. 50 le flacon

PÉPIN et LEBOUCQ,

à COURBEVOIE (Seine)

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée

Granulé à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Propriétés thérapeutiques. — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

Indications. — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

3 fr. 50 le flacon

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la Peau et des Muqueuses
Désinfectante, microbicide, cicatrisante.
Ni toxique, ni caustique, ni irritante.

Composition. — Combinaison à base d'acide borique, de réaction neutre, soluble à 15% dans l'eau à la température ordinaire. Est isotonique au milieu oculaire à la dose de 2,5 % (une cuillerée à soupe par litre d'eau bouillie).

Indications et doses. — Pour les *plaies*, *brûlures* et *blessures*, en poudre (succédané de l'iodoforme) ou en pansements humides, suivant les cas. En solution d'après le tableau ci-dessous pour :

Maladies du Nez et des Voies respiratoires : irrigations, 1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

Maladies des Yeux, lotions, et de la Bouche : gargarismes, 2 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

Maladies des Oreilles : instillations. Gynécologie et Voies urinaires : injections, 3 à [illegible] cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

La cuillère à soupe contient 25 gr. de **Boricine.**

Prix : 2 fr. la boîte.

Dépôt : 17, rue Cadet, PARIS

BROMONE ROBIN

Bromo-Peptone ou Peptonate de Brome

Composition. — Combinaison physiologique brome et peptone contenant 16,40 % de Brome pur.

Forme. — Gouttes dosées à un demi-centigramme de Brome pur. 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de Bromure de K.

Propriétés thérapeutiques. — Agent sédatif et calmant. Diminue l'excitabilité nerveuse. Tolérance parfaite, ne provoque jamais d'accident de bromisme.

Indications. — Toutes celles du Bromure de K. — Maladies nerveuses, irritabilité nerveuse des femmes, des jeunes filles, troubles névropathiques chez les enfants. Insomnie des vieillards, hystérie, épilepsie.

Dose. — 10 à 50 gouttes 2 fois par jour au moment des principau repas.

Prix : 4 fr. 50

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

BROMURE DE CAMPHRE CLIN

Camphre monobromé

Composition. — Camphre monobromé $C^{10} H^{15} BrO$. Contient 38, 40 % de brome à l'état dissimulé. On doit au Dr Clin un procédé de fabrication industrielle donnant un produit pur et bien cristallisé. (Académie des Sciences, août 1875).

Formes. — 1° *Capsules du Dr Clin au bromure de camphre*, enrobées au gluten, à 0 gr. 20 par capsule. Prix : 5 fr. le flacon de 50 capsules.

2° *Dragées du Dr Clin au bromure de camphre* à 0 gr. 10 par dragée. Prix : 5 fr. le flacon de 60 dragées.

3° *Tubes stérilisés Clin au bromure de camphre*, dosés à 0 gr. 05 et 0 gr. 10 par cm^3 Prix : à 0 gr. 05, 1 fr. 50 la boîte de 6 ampoules, de 12 ampoules 2 fr. 75 ; à 0 gr. 10, 2 fr. la boîte de 6 ampoules, de 12 ampoules 3 fr. 50.

Doses. — Commencer par 2 capsules ou 4 dragées par jour en augmentant progressivement jusqu'à 5 capsules ou 10 dragées. Diminuer ensuite jusqu'à la dose initiale. Interruption de 8 jours et reprise du même traitement. On peut donner le bromure de camphre jusqu'à 4 gr. par jour chez l'adulte. Par voie hypodermique : 5 à 10 cgr. par jour.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

CACHET CÉPE

Pyramidon Creil..... 0.30 cgr.
Caféine............. 0.05 cgr.

Dose. — 1 cachet Cépé à la fois, 3 par jour à intervalle de 3 à 4 heures entre chaque dose (chaque cachet est logé dans une boîte d'origine en fer-blanc avec bande de garantie).

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les qualités du Pyramidon "Creil", mais relève la tension artérielle chez ceux qui ont l'appareil cardio-vasculaire sensible au pyramidon.

Indications. — Médication de choix des Migraines, des Névralgies et des Fièvres de toute nature.

Produits Pharmaceutiques spéciaux "CREIL" de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline.

9, rue du Faubourg Poissonnière, PARIS (IXe)

Pharmacien :

Laboratoire E. DUPUTEL

à Creil (Oise)

C

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaïacol, à la dose de 0,05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir dans une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Se dissolvant lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Prix réglementé : 3 francs

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel, PARIS

C

CETRAROSE
du DOCTEUR GIGON

$C^{30}H^{22}O^{15}$

Acide Protocétrarique soluble

Forme. — Solution alcoolique d'acide protocétrarique.

Propriétés. — Excitant des mouvements péristaltiques stomacaux et intestinaux. Action élective sur la tonicité et l'excitabilité musculaire de l'estomac. Anti-émétique; Antidyspeptique; Analgésique gastrique.

Indications. — Vomissements en général et états nauséeux, Vomissements de la grossesse, Mal de mer, Pyrosis, Spasmes du Pylore, Atonie gastrique, Hypo et Hyperchlorhydrie, États neurasthéniques liés à des troubles gastro-intestinaux.

Dose et mode d'emploi. — 20 à 30 gouttes en une seule fois, sur un morceau de sucre ou dans un peu d'eau. Cette dose peut être répétée d'heure en heure jusqu'à 150 à 200 gouttes par 24 heures.

A. GIGON & Dr André GIGON, pharm.

7, rue Coq-Héron, PARIS

CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1° 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2° 0,10 cgr. de poudre sélectionnée de Rhamnus purshianus.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 pilules le soir en se couchant, après 15 jours espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix réglementé : le flacon, 2 fr. 50

Pharmacie MIDY

140, faubourg St-Honoré

PARIS (VIIIe)

C

CERÉBRINE

(Coca théine analgésique Pausodun)

Liqueur agréable
de composition bien définie

Doses. — Une cuillerée à soupe dans une ou deux cuillerées d'eau à prendre en deux fois à 5 minutes d'intervalle à distance des repas (1 heure avant ou 2 heures après). Renouveler au besoin jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Enfants au-dessus de 6 ans : 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.

Indications thérapeutiques des principales variétés de Cérébrine :

Cérébrine simple : Migraines, Névralgies en général;

Cérébrine bromée : Migraines, Névralgies tenaces, Règles douloureuses;

Cérébrine bromo-iodée : Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, sciatiques;

Cérébrine quiniée : Courbature, début et fin de grippe.

Sur demande seulement :
sans analgésine, sans éther ou sans sucre.

Prix réglementé : le flac., 5 francs

E. FOURNIER & Cie, pharmaciens
147, Bd Montparnasse, PARIS

CHOLERGINE

Extrait hépatique injectable (2 cm^3) synthétisant tous les éléments glandulaires du foie de *taureau* (bile et parenchyme)

Mode d'emploi. — Injection profonde ou intra-musculaire (indolore) tous les jours ou tous les deux jours. Un repos de dix jours entre chaque série de 10 injections. Léger massage après piqûre.

Propriétés. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique.

Préparation sans similaires ni équivalents, employée journellement dans les hôpitaux.

Prix réglementé :
la boîte de 10 amp. de 2 cm^3, 8 francs

Laboratoires de Biologie
A. DANIEL-BRUNET

5, rue du Docteur-Blanche, PARIS

CHOLÉINE CAMUS

à l'extrait décoloré et inaltérable de Fiel de Bœuf

Capsules glutinisées, dosées à 0,20 de principe actif.

Dose moyenne. — 4 à 6 pilules par jour.

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Ictères, Acholie, Cholémie, Constipation, Fermentations intestinales, Entérites muco-membraneuses, Auto-intoxications, Arthritisme, Insuffisance biliaire et hépatique.

Prix : le flacon, 4 fr. 50
(Produit réglementé)

A. CAMUS, pharmacien
à Moulins (Allier)

COLCHIQUE BYLA

(ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur inaltérable de la plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche ou 1/10e de mgr. de colchicine cristallisée.

Dose et mode d'emploi. — 10 à 15 gouttes par jour qu'on augmentera progressivement jusqu'aux premiers phénomènes de diarrhée signalant l'action de la colchicine sur l'intestin. A prendre dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Antigoutteux.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

C

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Méthyle Salicylate)

Capsules dont chacune contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans 0,20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel obtenu par fermentation et distillation et équivalant à 0,25 cgr. Salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Propriétés thérapeutiques :

du Salicylate de Méthyle

1° Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine;
2° Calme la douleur;
3° Liquéfie et augmente la sécrétion biliair
4° Légèrement diurétique;
5° Diaphorétique;
6° Diminue la fièvre;
7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée);
8° Action antiseptique sur le sang.

de la Colchicine

1° Diminue la production d'acide urique;
2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation;
3° Soulage la douleur;
4° Augmente la sécrétion biliaire;
5° Légèrement diurétique;
6° Diaphorétique;
7° Purgatif.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Pharmacie MIDY

140, faub. St-Honoré, PARIS (VIII°)

CITROSODINE GRÉMY

Citrate trisodique chimiquement pur

Comprimés.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : 5 à 10 comprimés, et plus au besoin, dissous dans un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour, au moment des repas.

Enfants : 4 à 6 comprimés, et plus au besoin, dissous dans un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour au moment des repas.

Nourrissons : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon dans le cas contraire.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant de l'hyperchlorhydrie, eupeptique, sédatif, anti-émétique. Tous les avantages du bicarbonate de soude sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — Dyspepsie hypersthénique, Fermentations gastriques, Dyspepsie hyposthénique ou nervomotrice, Dilatation d'estomac, Dyspepsie des nouveau-nés et des enfants du premier âge, gastrites aiguës ou chroniques, Gastroxynsis, Gastralgie, Crampes, Ulcère de l'estomac, Vomissements des nourrissons, Lithiase rénale, Gravelle urique, Goutte, Diabète et Obésité.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

C

COCAINE MIDY

Chloroboratées

Chaque *Pastille* contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.
0,05 cgr. de Chlorate de Potasse.
0,05 cgr. de Biborate de Soude.

Dose et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur, spécifique des maladies de la muqueuse et des voies respiratoires supérieures.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge.

Prix réglementé :
le flacon avec " boîte de poche ", 3 fr.

Pharmacie MIDY

140, faub. St-Honoré, PARIS (VIIIe)

COMPRIMÉS
de THIOCOL ROCHE

1 comprimé de Thiocol Roche = 0,50 cgr. de Thiocol Roche.

1 gr. de Thiocol Roche = 0,52 cgr. de Gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 2 à 10 par jour; *Enfants :* 1 à 4 par jour, et plus selon indications.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Indications. — Toutes les affections Broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Entérite, Diarrhées, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive et même toxique, il importe de bien spécifier toujours : *Comprimés de Thiocol Roche.*

Prix réglementé :
le tube de 20 comprimés, 2 francs

F. Hoffmann La Roche & C°
21, place des Vosges — PARIS

CRÉOSOTAL HEYDEN

Dérivé de la créosote, ni toxique ni caustique
contenant 94 % de créosote

Liquide dosé à 4 gr. par cuillerée à café. *(Prescrire 1 flacon " Créosotal Heyden ").*

Doses et mode d'emploi. — *En une fois : Enfants :* 0 gr. 20 à 1 gr. (6 à 30 gouttes). *Adultes :* 1 gr. à 4 gr. *Dose journalière :* Jusqu'à 4 fois la dose unique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiphtisique, Antiscrofuleux.

Indications. — Phtisie, Pneumonie de toute espèce, Catarrhes aigus des voies respiratoires, Complications pulmonaires dans la Rougeole, Pseudo-croup, Diphtérie, Scrofule, Typhus (désinfection de l'intestin).

Prix : le flacon, 3 fr. 50

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (Xe)

C

COMPRIMÉS de CHATELGUYON

Créés par Miraton en 1902

(Ne pas confondre avec le Laxatif Miraton)

Aux sels naturels de la source Châtelguyon-Miraton, les comprimés "Châtelguyon-Miraton" sont très solubles même dans l'eau froide qu'ils gazéifient.

Leur composition. — Sels naturels 15 cgr.; Bicarbonate de soude, 25 cgr.; Acide tartrique, 10 cgr., assurent une solution fortement gazeuse, d'une saveur acidulée agréable, jouissant de toutes les qualités de l'eau de Châtelguyon.

Dose. — 4 ou 5 comprimés par verre d'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Toni-laxatif à effet lent et doux.

Indications. — En remplacement des Eaux de Châtelguyon dans les cas de Constipations, Dyspepsie, Entérite, Lavages intestinaux, etc.

Prescrire la marque Miraton

Prix réglementé : le flacon, 2 francs

Etablissem^ts Châtelguyon-Miraton

Autorisation de l'Etat

CURGOL VICARIO

Glycocholate de Mercure

Comprimés dosés à 0,01 cgr. d'Hg. Facilement désagrégeables.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour après les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Le Curgol est un Glycocholate de Mercure facilement assimilable, ne provoquant aucune irritation intestinale et dont l'activité est comparable à celle des frictions et des injections. Il peut être employé avec succès dans tous les cas de syphilis qui n'exigent pas une intervention énergique immédiate.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Prix réglementé :
le tube de 20 comprimés, 2 fr. 50

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

DIABÉTIFUGE

Synthèse des agents médicamenteux les plus efficaces pour accroître l'énergie glycolytique (bioxyde de manganèse, bicarbonate de soudc, chlorhydrométhylarsinatedelithine) d'une part, et pour modérer la glycogénie (antipyrine, nitrate d'uranc et santonine) d'autre part.

Forme. — Cachets de 1 gr.

Indications. — Diabète sous toutes ses formes.

Mode d'emploi. — Prendre dans la matinée et dans l'après-midi, un cachet avec un demi-verre d'Eau de Pougues. Continuer pendant 10 jours, faire une analyse des urines et si le chiffre du sucre éliminé est en décroissance suffisante, réduire à un cachet pendant 10 jours. Cesser toute cure au bout de 20 jours de traitement avec les cachets. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix de la boîte de 30 cachets :
5 francs (en France)

Laboratoire des Produits SCIENTIA

42, rue Blanche — PARIS

DIGITALE BYLA (ÉNERGÉTÈNE DE)
Suc pur inaltérable de la plante fraîche
Trente-six gouttes = 1 gr. de la plante fraîche ou 3/10e 1/2 de digitaline

Doses, mode d'emploi et indications thérapeutiques :

Hyposystolie. — 10 à 15 gouttes pendant 4 à 5 jours. Interrompre 8 à 15 jours, puis reprendre.

Rétrécissement mitral contre la dyspnée. — 10 à 20 gouttes 3 à 4 jours de suite tous les 15 jours.

Endocardite et Péricardite. — 10 à 15 gouttes pendant 2 à 5 jours.

Palpitations et Tachycardie. — 5 à 6 gouttes pendant 8 jours.

Asthme cardiaque, Dyspnée, liés aux cardiopathies organiques. — 15 à 20 gouttes pendant 2 à 5 jours.

Artério-sclérose avec *Néphro-sclérose* et bruit de galop. Comme tonique et diurétique. — 5 à 10 gouttes pendant 8 jours.

Grippe, Pneumonie, Pleurésie, Rhumatisme articulaire. Comme toni-myocardique et surtout comme diurétique. — 5 à 15 gouttes pendant 4 à 5 jours.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

DIGITALE (INTRAIT DE)

Propriétés thérapeutiques. — L'Intrait de Digitale a une action en tout comparable qualitativement à celle de la Digitale en nature. Action moins brutale, mais plus soutenue, plus durable et moins passagère que celle de la Digitaline.

Particularité. — L'Intrait de Digitale peut être employé en *injections hypodermiques*, indolores et bien tolérées.

Indications. — Les mêmes que celles de la Digitale.

Doses et mode d'emploi. — Formes habituelles d'administration des préparations de Digitale, et en injection hypodermique.

A. *Par voie gastrique.* — 1° Comme *dose cardio-tonique*, 10 à 15 mgr. d'Intrait de Digitale par jour et pendant une quinzaine; 2° Comme *dose sédative*, 25 à 30 mgr. d'Intrait de Digitale pendant 3 à 4 jours consécutifs, avec intervalles de 10 à 12 jours; 3° Comme *dose massive asystolique*, 10 à 12 cgr. en une seule dose.

B. *Par voie hypodermique.* — 1° Comme *dose sédative*, 0 gr. 01 à 0 gr. 025 pendant 3 ou 4 jours consécutifs; 2° Comme *dose massive de Huchard*, 0 gr. 10 en une seule dose.

DIONINE-MERCK

Chlorhydrate d'éthylmorphine

Caractères. — Poudre cristalline blanche, sans odeur, de saveur légèrement amère, très soluble dans l'eau (solution neutre).

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif remarquable de la toux et de la douleur, plus actif que les opiacés et tous leurs dérivés, même synthétiques, préférable à la morphine chez les enfants, anesthésique et lymphagogue (ophtalmologie).

Indications. — Toux de toute origine, douleur de toute nature, cure du morphinisme.

Dose et mode d'emploi. — Par jour : 0 gr. 05 à 0 gr. 10 en sirop, potion, injections sous-cutanées, suppositoires, etc.

Sirop, Pâte, Tablettes et Ampoules du Docteur Bousquet (voir fiche spéciale)

Dionine-Merck, en flacons d'origine de 1, 5 et 10 gr.

Pharmacie du Docteur BOUSQUET
Licencié-ès-Sciences
140, faubourg Saint-Honoré
PARIS

DIURÈNE

(Suc total d'adonis vernalis)

Propriétés thérapeutiques. — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. Succédané inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'arythmie, d'asystolie, d'œdème, dans toutes les affections du foie, néphrites, artério-sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Le flacon : 4 francs

M. CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS

DRAGÉES NYRDAHL

à l'Ibogaïne

Composition. — A base de chlorhydrate d'ibogaïne. Chaque dragée renferme 0 gr. 005 de chlorhydrate. (Voir fiche *Ibogaïne).*

Dose. — 3 à 6 dragées par jour (et plus) après ou entre les repas; avaler sans croquer.

Propriétés thérapeutiques. — Névrosthéniques, toni-cardiaques, excitantes de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Epuisement, Dépressions nerveuses, Atonies musculaires, Grippe, Convalescences, Impuissance provenant de ces maladies.

Prix : 5 francs le flacon

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

EAUX-BONNES

(Basses-Pyrénées, par Pau, à 40 kil.)

Eaux chloro-sulfurées sodiques tièdes (33°). *Source Vieille*

Cure saisonnière (15 juin-30 septembre). Surveillance médicale recommandée.

Cure à domicile (la plus exportée des eaux sulfureuses).

Indications. — Maladies chroniques des voies respiratoires : Nasopharynx, larynx, bronches, poumons.

Bacillose pulmonaire ; prétuberculose, tuberculose fibreuse à évolution torpide, et cavitaire stationnaire.

Enfants : Scrofulose, Chloro-Anémie, Adénopathie trachéo-bronchique.

Dr Ch. SEMPÉ ✠, Médecin consultant l'hiver à Paris (n'ex. pas)

ÉLATINE BOUIN

Extrait du sapin de Norwège
(Gemme et Goudron)

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Doses et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuillerées à soupe par tasse, plusieurs fois par jour — 1 à 2 cuillerées à café pour les Enfants.

A *Titre Préventif,* en temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'**Elatine** peut être prise additionnée à la boisson habituelle aux repas, à raison d'une cuillerée à dessert par verre de liquide.

Ces doses peuvent être augmentées sans aucun inconvénient.

S'emploie en outre en *fumigations, pulvérisations, gargarismes,* etc., etc.

Indications thérapeutiques.—Affections des bronches, vessie et reins.

2 fr. 50 le flacon

A. FAGARD, Pharmacien

23, avenue de la Motte-Piquet, PARIS

ELBON CIBA

Composition. — Combinaison d'acide cinnamique et d'oxyphénylurée, agissant comme antipyrétique doux et modificateur des sécrétions bronchiques.

Indications. — Fièvre tuberculeuse, Catarrhes infectieux des voies respiratoires.

Forme. — Comprimés à 1 gramme.

Dose. — De 4 à 2 comprimés par jour, pour un traitement de longue durée.

Flacons d'origine de 20 comprimés
4 fr. 50

Flacons d'origine de 10 comprimés
2 fr. 50

Société pour l'Industrie Chimique

à SAINT-FONS (Rhône)

ELECTRARGOL

(Argent colloïdal électrique à petits grains, stable)

Formes. — Ampoules de 5 cm^3.

Prix : 6 fr. la boîte de 6 ampoules

Ampoules de 10 cm^3.

Prix : 6 fr. la boîte de 3 ampoules

Flacons stérilisés de 50 et 100 cm^3. (Fermeture spéciale).

Prix : 6 fr. et 10 fr.

Ampoules compte-gouttes de 10 cm^3 pour collyres.

Prix : 2 fr. 50 l'ampoule compte-gouttes

Doses et mode d'emploi

Injection intramusculaire	: 10 à 20 cc.	et plus.
— intraveineuse	: 5 à 15 cc.	—
— intrarachidienne	: 5 à 10 cc.	—
— intrapleurale	: 20 à 50 cc.	—
— loco dolenti	ad libitum	

chez l'enfant en bas-âge : 3 à 5 cc.

Remarque. — D'une manière générale on se rend compte facilement que la dose administrée est suffisante lorsque l'injection provoque un abaissement de la température précédé ou non d'une réaction thermique avec frissons ; cette réaction peut être assez violente, mais elle est de courte durée et ne doit pas alarmer. Poursuivre le traitement au delà de l'apyrexie désirée afin d'éviter une reprise de la température.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

ELECTROCUPROL

Composition. — Oxyde de cuivre colloïdal à petits grains, obtenu par pulvérisation électrique. L'*Electrocuprol* se présente sous l'aspect d'un liquide brun clair, dichroïque, possédant toutes les propriétés générales des métaux colloïdaux, savoir : pouvoir fermentaire, catalytique et bactéricide.

Formes. — Ampoules de 5 et 10 cm³. La boîte de 6 et 3 ampoules 6 fr. L'ampoule compte-gouttes collyre de 10 cm³. Prix : 2 fr. 50.

Applications thérapeutiques. — L'*Electrocuprol* est employé dans le cancer, en tuberculose, dans les maladies infectieuses.

Doses et mode d'administration. — L'*Electrocuprol* est délivré en ampoules de 5 cm³ et de 10 cm³. L'isotonie de la solution est assurée au moment même de l'usage. On l'injecte dans les muscles, à la dose de 5 ou 10 cm³ tous les jours ou tous les deux jours, dans les veines à la dose quotidienne de 5 à 20 cm³ selon l'urgence, la gravité de l'affection et la résistance du malade.

COMAR et Cie

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ELECTROMARTIOL

Composition.— Fer colloïdal à grains très fins et uniformes obtenu par voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide brun ambré, légèrement dichroïque, titrant 1 gr. de fer pour 1000.

Formes. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cm³. — Prix : 5 fr.; Boîtes de 6 ampoules de 5 cm³. — Prix : 5 fr.

Applications thérapeutiques et posologie. — Permet de réaliser une médication ferrugineuse hypodermique ou intra-veineuse modèle. Unit aux propriétés spécifiques du fer les propriétés générales des métaux colloïdaux. Injection complètement indolore et ne déterminant jamais de nodosité. Relève rapidement le chiffre des globules rouges et la valeur globulaire; améliore la nutrition générale. Formellement indiqué dans tous les cas de syndrôme anémique : anémie essentielle, chlorose (injection quotidienne de 2 cm³), anémies post-hémorragiques, anémies toxiques et anémies infectieuses (5 à 10 cm³ en injection intraveineuse tous les jours ou tous les deux jours.

COMAR et Cie
20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ÉLECTROSÉLÉNIUM

Composition.- Sélénium colloïdal à grains ultra-microscopiques extrêmement fins et uniformes, obtenu par la voie électrique. Sc présente sous l'aspect d'un liquide rougc corail, transparent, fortement trouble par réflexion.

Formes. — Ampoulcs de 5 cm³. Prix : 6 fr. la boîte de 3 ampoules.

Applications thérapeutiques.- Affections cancéreuscs. L'*Electrosélénium* a été substitué au sélénium simple à cause de sa très faible toxicité, liée à une activité remarquable. Les travaux de Cade et Girard, Girard, Bougeant et Galliot, Blumcnthal, Trinkler, Szecsi, etc., ont montré que, sous l'action des injections d'*Electrosélénium* chez les cancéreux, on obscrvait régulièrement la diminution, puis la disparition des doulcurs, le relèvement du poids, l'amélioration de l'état général, le ramollissement des tumeurs ganglionnaires, la régression des lésions néoplasiques, et parfois leur cicatrisation, ou tout au moins la suppression des sécrétions fétides et des hémorragies.

Posologie et mode d'administration. — L'*Electrosélénium* s'administre à la dose moyenne de 5 cm³ à la fois, tous les deux jours ou tous les jours, suivant les cas. On peut doubler cette dose. Pour retirer du traitement tout le bénéfice possible il faut administrer le sélénium, de préférence par voie intra-veineuse.

COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

ELIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure

Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et de Mercure en combinaison stable. Teneur en iode 0 gr. 035 et en mercure 0 gr. 005 par cuillerée à soupe. Dépourvu d'arrière-goût métallique.

Propriétés thérapeutiques.— Antisyphilitique.

1º Absence d'accidents d'hydrargyrisme, grâce à l'action spéciale du tanin.

2º Innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhée). Des faits cliniques montrent l'Elixir Déret souvent toléré par des malades qui ne pouvaient antérieurement supporter un autre traitement mercuriel.

Doses.— *Adultes :* 1 cuillerée à soupe; *Enfants :* 1/2 à 1 cuillerée à café ; à prendre 2 fois par jour dans un verre gradué pour éviter le contact du médicament avec le métal de la cuillère. Ces doses peuvent être doublées.

Nota. — Aucune indication de la nature mercurielle de la préparation n'est faite sur l'étiquette ni sur l'enveloppe. L'Elixir Déret peut donc être pris aussi discrètement qu'on le désire.

Prix : 4 fr. 50 le flacon

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ELIXIR DE PAPAINE BYLA

à base de ferment végétal extrait du carica papaya

1 verre à liqueur = 0,50 cgr. de papaïne pure

Existe également sous forme Sirop

Dose et mode d'emploi. — Un verre à liqueur après chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Digestif puissant, analeptique, eupeptique.

Indications. — Affections de l'estomac : dyspepsies, flatulences, dilatation, etc.

Prix réglementé : 4 fr. le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

ELIXIR DE PEPSINE BYLA

Dosé à 0,50 cgr. de Pepsine dialysée Byla, titre 100, par verre à liqueur ou cuillerée à bouche

Dose et mode d'emploi. — Un verre à liqueur ou une cuillerée à bouche après chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Digestif naturel.

Indications. — Dyspepsies et gastrites. Provoque le relèvement de l'appétit et des forces dans tous les cas où l'alimentation paraît insuffisante.

Prix réglementé : 4 fr. le flacon
— 2 fr. le 1/2 —

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

ELIXIR DE PROPEPTONEFER BYLA

Peptonate de fer préparé au sang de bœuf privé de sérum

Existe également sous forme de gouttes concentrées

Dose et mode d'emploi. — 1/2 ou 1 verre à liqueur à la fin des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Fer assimilable ne constipant pas et ne noircissant pas les dents. Reconstituant et digestif.

Indications. — Anémie, Chlorose, débilité générale.

Prix réglementé : 4 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EMULSION MARCHAIS

Phospho-Créosotée

Contenant par cuillerée à café

Créosote de hêtre .... 0,10 cgr.
Baume de tolu .... 0,20 »
Glycérophosphate de chaux 0,20 »

Dose. — 3 à 6 cuillerées à café, dans un peu de lait ou de tisane tièdes et sucrés.

Indications. — Toutes celles de l'Huile de Foie de Morue qu'elle remplace avantageusement.

Prix : 3 fr. le flacon

Laboratoire de A. MARCHAIS, Ph^ien
à LA ROCHELLE

ENÉSOL

Composition. — *Salicylarsinate de mercure*, à arsenic et mercure dissimulés. *Renferme 38,46 % de Hg. métal*, et *14, 4 % de As* sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne *coagulent pas* l'albumine.

Forme. — Ampoules de 2 cm³ et de 5 cm³ contenant 0 gr. 03 de salicylarsinate de mercure par cm³ correspondant à 0,0115 de Hg. métal et à 0,0043 de As métalloïde par cm³.

Prix : 4 fr. la b^te de 10 ampoules de 2 cc.
— 5 fr. — 6 — 5 —

Propriétés thérapeutiques. — Agent antisyphilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : Injection *intra-musculaire* d'une ampoule (2 cm³) par jour. Dose massive : Injection *intra-musculaire* ou *intra-veineuse* de 4 à 8 cm³ tous les 2 ou 3 jours.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ENGELUROL

Spécifique des Engelures

Sirop spécialement polyminéralisé à base de Ca, Ph, I, Fe, Br, Mg, Cl, K

Propriétés. — En reminéralisant l'organisme, fait disparaître la prédisposition aux engelures toujours liée à un taux de minéralisation inférieur à la normale (croissance, lymphatisme, débilité).

Indications. — Les engelures même les plus graves guérissent en moins d'une semaine. Résultat constant.

Aucune contre-indication, si ce n'est l'*Artério-Sclérose* et l'*Athérome* à cause de la richesse en chaux de la préparation.

Doses (à prendre dans l'eau ou dans la boisson habituelle) :

Adultes : 2 cuillerées à café au milieu du déjeuner et 2 au milieu du dîner. Si dès le 5e jour l'amélioration n'est pas obtenue, faire prendre 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin, puis augmenter d'une cuillerée tous les 2 jours jusqu'à dose nécessaire et suffisante. Dose maxima par jour, 12 cuillerées à café.

Enfants : Dose maxima : une cuillerée à café par jour et par année d'âge, à donner en 3 fois, matin, midi et soir.

Spécialité réglementée, prix : 3 fr. le flac.

Dépôt général : **Pharmacie LACHARTRE**

41, rue de Rome, PARIS

ENTEROKINASE BYLA

Muqueuse intestinale

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques.— Constipation, Entérite muco-membraneuse, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

E

ERGOT DE SEIGLE

(Extrait fluide Dausse)

Extrait fluide à poids égal d'Ergot (Codex 1908) pour injections hypodermiques

Propriétés thérapeutiques. — Vasoconstricteur et excitant des fibres musculaires lisses, hémostatique.

Indications. — Hémorragics internes, métrorragies, hémorragies post partum par inertie utérine (si l'utérus est vide toutefois), hémorragies de la ménopause. Décongestif, congestion pulmonaire, congestion médullaire et cérébrale, etc.

Posologie. — 1 à 2 cm^3 en injection hypodermique.

Laboratoire Pharmaceutique
DAUSSE Aîné
4, rue Aubriot, PARIS

EULACTINE MILLET

Culture pure sur milieu végétal du plus puissant ferment lactique connu (Bacille de Cohendy)

EULACTINE

Cultures liquides : Bouillon, 4 flacons d'une dose journalière. Prix : 6 fr.

Cultures sèches : La boîte de 8 tubes d'une dose journalière. Prix : 6 fr.

La boîte de 5 tubes. Prix : 4 fr.

La boîte de 5 tubes de 10 comprimés. Prix : 4 fr.

Propriétés thérapeutiques. — Bactériothérapie intestinale.

Indications. — Infection intestinale, entérite muco-membraneuse, gastro-entérite des enfants et des nourrissons, constipation atonique, grippe intestinale, appendicite chronique, etc.

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

EXO-HÉPATINE BYLA

Suc naturel inaltérable de la glande hépatique du porc

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour à prendre entre les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique propre dans toutes les insuffisances hépatiques : Cirrhoses, Hypertrophie, Ascite, Diabète et Lésions de la rate.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

EXO-HYPOPHYSINE BYLA

Suc naturel inaltérable de la glande hypophysaire du bœuf

75 gouttes = 1 glande hypophysaire fraîche

Dose et mode d'emploi. — 75 gouttes deux fois par jour à prendre matin et soir dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas de myxœdème et d'infantilisme.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

EXO-ORCHITINE BYLA

Suc naturel inaltérable de la glande orchitique du taureau

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour à prendre entre les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques : Exerce une action opothérapique propre dans les déchéances physiologiques ou toxiques, la Débilité sénile, les Névroses, l'impuissance et le simple surmenage.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EXO-OVARINE BYLA

Suc inaltérable de la glande ovarique de la brebis

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour à prendre entre les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques : Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas de troubles fonctionnels.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EXO-PANCRÉATINE BYLA

Suc normal inaltérable
du Pancréas du Porc

Renferme à l'état naissant les trois ferments de la glande pancréatique : *Amyloprine, Trypsine, Lipase.*

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour à prendre après les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques : Exerce une action opothérapique propre sur les fonctions physiologiques des organes digestifs, notamment sur l'intestin dont elle est le tonique par excellence.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EXO-PULMINE BYLA

Suc inaltérable du poumon de chèvre

Dose et mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas d'affections pulmonaires : Pneumonies, Bronchites, Tuberculose, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

EXO-RÉNINE ou EXO-NÉPHRINE BYLA

Suc naturel inaltérable du rein du porc

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais avec l'intégralité de ses zymases à l'état naissant.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour à prendre entre les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques : Exerce une action opothérapique propre dans les néphrites aiguës ou chroniques, les accidents de l'urémie et de l'albuminurie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

EXO-THYROIDINE BYLA

Suc naturel inaltérable du corps thyroïde du mouton

30 gouttes = 1 lobe thyroïdien frais

Dose et mode d'emploi. — 30 gouttes deux fois par jour à prendre matin et soir dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas de myxœdème et d'infantilisme.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

FER RABUTEAU

(Protochlorure de fer cristallisé)

Formes. — 1° *Dragées de Fer du Dr Rabuteau* à 0 gr. 025 de $FeCl^2$.

Prix : 3 fr. le flacon de 100 dragées

2° *Elixir du Dr Rabuteau* à 0 gr. 10 de $FeCl^2$ par cuillerée à café.

Prix : 5 fr. le flacon de 300 cm^3

3° *Sirop du Dr Rabuteau* à 0 gr. 05 par cuillerée à dessert.

Prix : 3 fr. le flacon de 200 cm^3

Propriétés thérapeutiques. — Le plus assimilable des ferrugineux. Élève à la fois le nombre des globules rouges et leur teneur en hémoglobine.

Dose. — 4 à 8 dragées par jour; 1 à 2 cuillerées à café d'Élixir.

Nota. — L'altérabilité naturelle du protochlorure de fer est évitée par les formules du Dr Rabuteau.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

FIXINE GRÉMY

Lactate d'alumine

Granulé dosé à 1 gr. de lactate d'alumine par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 1 à 2 cuillerées à café après chacun des trois principaux repas. — *Enfants :* 1/2 dose. Avaler les grains de Fixine dans une gorgée d'eau sans les croquer, ou les mélanger à une confiture.

Propriétés thérapeutiques. — Antitoxique intestinal.

Indications. — Auto-intoxication intestinale et ses conséquences.

Contre-indication. — Diarrhée acide.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

FORTOSSAN CIBA

Sel de soude de l'acide phytinique, associé à la lactose

Forme spéciale du principe phospho-organique des graines végétales réservée aux enfants de moins de 2 ans.

Poudre : La boîte de 80 gr. : 2 fr.

Doses et mode d'emploi :

Enfants de moins de 2 mois : 2 mesures 2 fois par jour.

Enfants de 2 à 6 mois : 2 mesures 4 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 mois : 3 mesures 4 fois par jour.

Enfants de 1 à 2 ans : 4 mesures 4 fois par jour,

dans du lait ou de la bouillie. Le lait peut être stérilisé après solution.

Propriétés thérapeutiques. — Antirachitique.

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

GAIARSOL BOUTY

Méthylarsinate de Gaïacol

Ampoules dosées à 0,05 cgr. de Gaïarsol par unité.

Gouttes dont 20 = 0,05 cgr. de Gaïarsol.

Dose et mode d'emploi. — 20 à 50 gouttes ou une ampoule par 24 heures.

Indications thérapeutiques.—Médicament type dans la Tuberculose et les affections des voies respiratoires.

Prix réglementé : 4 francs la boîte
(Aux Médecins, net 2 fr.)

Laboratoires BOUTY
3bis, rue de Dunkerque, PARIS

GASTÉRASE BYLA

(Muqueuse stomacale)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0 gr. 15).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques : Hypopepsie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

GASTÉRINE FRÉMONT

Suc gastrique naturel secrété par l'estomac entier du chien vivant isolé d'après la méthode du Dr Frémont (15e année)

Liquide incolore.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à soupe, dans du bouillon ou de la bière pendant chaque repas; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Colloïde régénérateur de l'estomac.

Indications. — Embarras gastrique aigu ou chronique, Dyspepsie, Gastrite, Anorexie des Neurasthéniques ou des Tuberculeux, Gastro-entérite, Convalescence. *Cent fois plus active et deux fois moins chère que toutes ses imitations.*

5 fr. le flacon; 2 fr. 75 le 1/2 flacon

Dr FRÉMONT, Ancien Interne-Lauréat des Hôpitaux de Paris
Chevalier de la Légion d'Honneur

Médecin de l'Hôpital Thermal de VICHY (Allier)

a

GASTROSAN HEYDEN

Salicylate double de Bismuth

Trochisques dosés à 0,75 cgr. par unité.

Doses. — *Enfants :* 1 à 2 gr. par jour ; *Adultes ;* 4 à 6 gr. par jour. A prendre en 4 fois.

Propriétés thérapeutiques. — Action antiacide, antifermentative, antiseptique intestinal.

Indications. — Troubles hyperchlorhydriques, Pyrosis, Fermentations stomacales et intestinales, Augmentation de la putréfaction intestinale avec diarrhée opiniâtre, Vomissements chez les enfants par suite de décomposition du contenu stomacal.

2 fr. la boîte de 20 Trochisques

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard

PARIS (Xe)

GASTROZYMASE BOUTY

Suc gastrique naturel concentré

Comprimés solubles.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés à prendre au milieu de chaque repas, dissous dans 3 à 4 cuillerées à bouche d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques : Digestif immédiat, antiseptique, excito-secrétoire.

Indications. — Embarras gastrique, Dilatation, Indigestion, Dyspepsie atonique, Neurasthénie, Anémie, Débilitation générale, etc.

Contre indications. — Hyperpepsie, Hypéracidité.

Prix réglementé :
4 fr. la boîte de 45 comprimés
Aux médecins : Escompte : 50 %

Laboratoires BOUTY

3bis, rue de Dunkerque, PARIS

GENÊT BYLA (Energétène de)

Suc pur inaltérable de plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche ou 0,022 mgr. de spartéïne.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 gr. par jour en 2 ou 4 fois à prendre dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Toni-cardiaque, nervin, diurétique.

Indications. — Hyposystolie, Insuffisance mitrale, Cardiopathie artérielle, Artériosclérose, Néphrites, Œdèmes.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

GLOBULES TÆNIAFUGES
DE SECRÉTAN

Composition. — Extrait éthéré des rhizomes frais de fougère mâle des Vosges, sans chloroforme ni calomel.

Indications. — Tænifuge et anthelmintique contre le *botriocéphale*, les deux *ténias* (*armé* et *inerme*), *l'ankylostome* et le *cysticerque*.

Mode d'emploi. — Prendre les globules le matin à jeun, de 5 en 5 minutes dans un peu d'eau.

Prix du flacon : 10 fr.

Dépôt : 17, rue Cadet, PARIS

E. MEISSONNIER

118, rue Lafayette, PARIS (Xe)

GLUTOL

Poudre de gélatine agglutinant l'aldéhyde formique.

Dose et mode d'emploi. — Saupoudrer abondamment.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des tissus, le Glutol rend libre l'aldéhyde formique, microbicide puissant et antiputrescible hors ligne.

Indications. — Brûlures, Plaies, Suppurations.

Prix : 10 gr., 0 fr. 80

PHARMACIE RATIONNELLE
4, faubourg Poissonnière

GLYCÉROPHOSPHATE
ROBIN

Composition et forme. — Granulé de Phospho-Glycérates de Chaux et de Soude purs.

Action physio-thérapeutique. — Le glycérophosphate étant l'élément constitutif de la substance nerveuse, a une action réparatrice très nette dans tous les cas d'affaiblissement des cellules nerveuses par défaut de nutrition. Excite l'appétit et relève les forces. Entretien du système nerveux et de la charpente osseuse.

Indications. — Rachitisme, Vice de développement du système osseux chez l'enfant, Neurasthénie, Phosphaturie, Déminéralisation de l'organisme.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 mesures par repas dans un peu d'eau ou de lait. 2 mesures correspondent à 30 cgr. de glycérophosphates.

Pour les enfants une mesure par repas.

Prix : le petit flacon, 4 fr. 50
— le grand, de 500 gr. 7 fr. 50

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

GLYCOGÈNE CLIN

Composition. — Hydrate de carbone voisin de l'amidon $(C^6 H^{10} O^5)n$. Poudre blanche, insipide, soluble dans l'eau en donnant un liquide opalescent que l'acide acétique éclaircit.

Formes. — 1° *Capsules de Glycogène Clin* glutinisées à 0 gr. 20 par cm³.

Prix : 6 fr. le flacon de 40 capsules

2° *Granulé de Glycogène Clin* à 0 gr. 20 par cuillerée à café.

Prix : 6 fr. le flacon de 110 gr.

3° *Tubes stérilisés de Glycogène Clin* de 2 cm³ à 0 gr. 05 par cm³.

Prix : 6 fr. la boîte de 20 tubes de 2 cm³.

Dose. — *Voie buccale :* 60 cgr. à 1 gr. par jour (3 à 5 capsules ou cuillerées à café de granulé).

Nota. — Le granulé à base de sucre ne sera pas prescrit dans le diabète.

Voie hypodermique : 1 tube par jour (inj. intramusculaire).

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

G

GOUTTES

DE PROPEPTONEFER BYLA

Peptonate de fer préparé au sang de bœuf privé de sérum

Existe également sous forme d'élixir

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 30 à 40 gouttes deux fois par jour aux repas, dans le liquide préféré. *Enfants :* 1 goutte par année d'âge deux fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Fer assimilable ne constipant pas et ne noircissant pas les dents. Reconstituant et digestif.

Indications. — Anémie, Chlorose, Débilité générale.

Prix réglementé : 4 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

GUI BYLA

(ENERGÉTÈNE)

Suc pur inaltérable de la plante fraîche

36 gouttes=1 gr. de plante fraîche.

Dose et mode d'emploi. — 20 50 gouttes par jour, à prendre en 4 fois dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotensives et diurétiques.

Indications. — Artériosclérose, Cardiopathies artérielles, Hypertension, Albuminurie, Néphrite, Néphrosclérose, Eclampsie, Hémoptysies, Hémorragies, Ménorragies, Epistaxis.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

H

HAMAMELINE ROYA

Préparation d'Hamamelis obtenue directement de la plante fraîche, contient à l'état concentré (0 gr. 20 par cuillerée à soupe), le principe actif, aromatique de la plante, " l'Essence ", à l'exclusion de la matière extractive, inerte au point de vue vasculaire. (Les *Gouttes*, *Extraits*, *Teintures*, *Pilules*, *Elixirs*, etc. d'Hamamelis, venant de la plante sèche ne renferment, eux, que la matière extractive et pas un atome du principe actif " l'Essence ").

Propriétés. — Vaso-constricteur énergique et durable. Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire puissant, Anticongestif.

Indications. — Toutes Dilatations, Congestions et Inflammations veineuses, Varices, Varicocèles, Hémorroïdes, Phlébites. Congestions, Fibromes, Métrorragies, Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Accidents congestifs de la Ménopause.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, demi-heure à une heure avant de manger.

Spécialité réglementée

Prix : le flacon .... 5 francs

Pharmacie LACHARTRE

41, rue de Rome — PARIS

HAMAMELIS

Les principes actifs des feuilles et de l'écorce de cette plante associés à ceux du capsicum brasiliense ont servi à la préparation de l'*Elixir de Virginie Nyrdahl.*

(Voir fiche particulière)

D'innombrables contrefaçons et imitations de ce produit ont été faites

Les mots *Elixir de Virginie* ainsi que le mot *Nyrdahl* sont déposés

Prescrire : *Elixir de Virginie Nyrdahl* ou *Elixir Nyrdahl*

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld
PARIS

HAMAMELIS
(EXTRAIT FLUIDE DAUSSE)

Extrait fluide à poids égal de feuilles (Codex 1908)

Propriétés thérapeutiques. — Vasoconstricteur utilisé contre les hémorragies internes.

Indications. — Hémorragies diverses, Hémoptysies, Métrorragies, Affections du système veineux, Varices, Hémorroïdes (action incertaine).

Posologie. — *Adultes :* en une fois 2 gr.; par jour, 6 gr. — *Enfants :* de 1 à 3 ans, 10 à 30 gouttes par jour; jusqu'à 5 ans, 1 à 2 gr.; jusqu'à 10 ans, 2 à 4 gr., en potion, sirop, élixir.

Elixir :

Extrait fluide d'Hamamelis Dausse 15 gr.
Sirop de framboises............ 200 —
Elixir de Garus } ãâ............ 50 —
Eau distillée... }

(2 à 3 verres à liqueur par jour)

Potion :

Extrait fluide d'Hamamelis Dausse 5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères 100 —
Teinture de vanille.............. 10 —

(par cuillerée à café)

HÉMATOL

Extrait sanguin à base de sérum hémopoïétique

Granulé agréable au goût

Dose et mode d'emploi. — 4 cuillerées à café de granulé par jour (2 cuillerées un quart d'heure avant les repas).

Propriétés thérapeutiques. — Excitant spécifique de la rénovation sanguine, excitant de l'Hémopoïèse.

Indications. — Anémies : essentielles, symptomatiques, toxiques, Chlorose, Convalescence, Déchéances organiques.

Prix réglementé :

Le flacon .... 7 francs

Laboratoire de l'Hématol

HÉMOGLOBINE BYLA

Principe ferrugineux du sang

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,05 cgr).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Anémie, Chlorose, Débilité, Faiblesse générale, Maladies nerveuses, Convalescences des maladies graves, Fièvres des pays chauds, Neurasthénie, etc.

Prix réglementé :

Le flacon .... 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

HEMOSTYL

DU DOCTEUR ROUSSEL

Sérum hémopoïétique de cheval

Présentations. — Ampoules de 10 cm³ (boîtes de 6 ampoules) : boire le contenu d'une ampoule le matin à jeun, dans un quart de verre d'eau.

Comprimés (boîtes de 45) : 6 à 8 par jour, 2 avant chacun des principaux repas.

Indications. — Toutes les Anémies, Convalescences, Tuberculose, Hémorragies (Métrorragies, Hémoptysies, etc.) : injecter 20 cm³ dans les cas graves; ingestion ou lavements dans les cas subaigus.

Toutes les applications du sérum de cheval

L. PREUD'HOMME
Pharmacien de 1re Classe
15, rue Gaillon — PARIS

HÉPATINE BYLA

Glande hépatique

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,15 cgr.)

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans toutes les insuffisances hépatiques : Cirrhoses, Hypertrophie, Ascite, Diabète et lésions de la rate.

Prix réglementé :

Le flacon .... 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire en ovoïdes glutinisés

Dose. — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas (avec un demi-verre d'eau destiné à faire pression sur le pylore et à entraîner le tout dans l'intestin) ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

Propriétés. — *L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Medical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal dans* la Constipation, l'Entérocolite et toutes les Affections du foie.

Prix réglementé :

Le flacon............. 5 fr. 75

Médication sans similaires ni équivalents

Laboratoires de Biologie

A. DANIEL-BRUNET

5, rue du Docteur-Blanche — PARIS

HÉROINE VICARIO

Chlorhydrate de l'éther diacétique
de la morphine

Comprimés solubles dosés à 0,005 mgr.

Comprimés solubles dosés à 0,0025 mgr. (colorés au cacao).

Comprimés solubles dosés à 0,010 mgr.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 1 à 8 comprimés de 0,005 par jour. — *Enfants :* 1 à 4 comprimés de 0,005 par jour.

Les comprimés Vicario diffèrent considérablement des comprimés similaires par leur désagrégation rapide et complète, leur assimilation certaine et leur dosage rigoureux.

Dose maxima en 24 heures : 5 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Eupnéique, antidyspnéique, calme remarquablement la Toux.

Indications. — Toutes les Affections des voies respiratoires.

Prix réglementé :

3 francs le flacon de 60 comprimés

Pour éviter toute substitution, prescrire *Héroïne Vicario*

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS

HIPPOPLASINE GRAN

Plasma musculaire manganique intégral, concentré, aseptique et inaltérable.

Une cuillerée à bouche = 0,01 cgr. de manganèse colloïdal

Dose et mode d'emploi. — *Adultes :* 3 à 6 cuillerées à bouche par jour. — *Enfants :* 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.

Verser la dose d'Hippoplasine en premier dans un verre, y ajouter ensuite en agitant doucement un peu d'eau froide, simple ou gazeuse.

Propriétés thérapeutiques. — Néozomothérapie.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, états anémiques, troubles de la nutrition, Psychoses, Neurasthénie, etc.

Prix réglementés :

Le demi-flacon..... 4 francs

Le flacon.......... 7 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

HORDÉNINE-LAUTH

Composition. — Sulfate d'Hordénine ($C^{10}H^{15}NO$). Nouvel alcaloïde extrait des touraillons d'orge.

Formes pharmaceutiques. — *Voie stomacale :* Bulles dosées à 0,10 cgr. de sel. En flacons de 50 bulles, 6 francs ou demi-flacons de 20 bulles, 2 fr. 50. Prescrire un flacon ou demi-flacon bulles d'Hordénine-Lauth.

Voie hypodermique : Ampoules dosées à 0,25 cgr. de sel par cm^3. En boîtes de 10 ampoules, 7 fr. 50, ou demi-boîtes de 5 ampoules, 4 francs. Prescrire une boîte ou demi-boîte, ampoules d'Hordénine-Lauth.

Lavements : Tourol, poudre-mère d'Hordénine-Lauth. En boîtes de 150 gr., environ, 2 francs.

Indications. — Spécifique des Diarrhées et Dysenteries en général. Diarrhées de toute nature, Gastro-entérites infantiles, Entérites, Entéro-colites, Dysenteries des pays chauds, amibiennes ou bacillaires, etc.

Posologie. — *Adultes :* 10 à 15 bulles par jour, ou une ou deux ampoules. — *Enfants* et *nouveau-nés :* Injecter un quart à une ampoule, ou bien donner de une à six bulles telles que, ou dissoutes dans de l'eau ou du lait.

Le Tourol sera employé pour des lavages d'intestin en décoction, à raison de 50 gr. pour 1000 d'eau bouillie.

C. PÉPIN, Docteur en Pharmacie
9, rue du Quatre-Septembre — PARIS

HUILE GRISE STÉRILISÉE

DE VIGIER

à 40 gr. de mercure pour 100 cm^3 d'huile (Codex 1908)

Un centimètre cube de cette huile correspond à 0,40 cgr. de Hg et une division de la seringue de Pravaz à 0,02 cgr.

Mode d'emploi. — Pour pratiquer les injections intra-musculaires *d'Huile grise Vigier*, il est préférable de se servir de la *seringue spéciale du Docteur Barthélemy, nouveau modèle stérilisable Vigier* à 15 divisions, dont chacune correspond *exactement* à un centimètre cube de Hg.

Doses à injecter. — Elles sont forcément variables selon les cas, le sujet, le poids, les périodes et la nature des accidents. Pratiquement, elles doivent être faites par séries de 6, espacées de 8 jours. Après 6 semaines de traitement, on accordera 4 semaines environ de repos au malade.

Doses moyennes de chaque injection. — Pour l'*adulte*, tous les jours, 8 cgr. de Hg ou 8 divisions de la seringue du Docteur Barthélemy. — Pour la *femme*, 6 à 7 cgr. — Pour l'*enfant*, au-dessus de 3 ans, 1 cgr.

Pendant la 1re année, on traitera 8 mois sur 12
— 2e — — 6 — —
— les 3e et 4e — — 4 — —

Pendant les années suivantes, en moyenne, *une année sur quatre.*

Prix du flacon stérilisé, environ 2 cm^3, pour 3 à 4 injections 2 25

Prix du double flacon stérilisé, pour 6 à 8 injections 4 25

Pharmacie VIGIER et HUERRE
12, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

HYDRASTIS

(Extrait fluide Dausse)
Extrait fluide à poids égal de rhizome
(Codex 1908)

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique interne, vasoconstricteur.

Indications. — Métrorragies, Ménorragies, Hémoptysies, Hémorragies viscérales, pulmonaires.

Posologie. — *Dose maxima* en une fois : 1 gr.; par jour : 5 gr. A prendre par 20 ou 30 gouttes à la fois, dans de l'eau sucrée ou une potion.

Potion :

Extrait fluide d'Hydrastis Dausse..................	ââ PE
Malaga blanc	
Sirop d'angélique.........	

HYPOPHOSPHITES
CHURCHILL

Sels de phosphore complètement assimilables, parce que non oxydés

Sirops et Ampoules (Voir la fiche Ampoules Churchill)

Sirop d'Hypophosphite de chaux Churchill : 0 gr. 20 par dose, dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

Sirop d'Hypophosphite de soude Churchill : 0 gr. 20 par dose, mêmes indications mais en cas d'hypertension artérielle et d'âge avancé.

Sirop d'Hypophosphite de fer Churchill : 0 gr. 10 par dose, dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée. *Et tous autres* sels : *manganèse, potasse, magnésie, ammoniaque, etc.*

Sirop d'Hypophosphite composé *Churchill* dans la proportion des bases minérales de l'organisme avec méthylarsinate de strychnine : 1 mgr. par dose, Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Dose pour adultes. — Une à deux cuillerées à soupe dans un peu d'eau après les deux principaux repas.

Le flacon............... 4 francs

(Prix réglementé)

Exiger la signature Churchill et la marque de fabrique de la Pharmacie SWANN

12, rue Castiglione — PARIS

HYPOPHYSINE BYLA

Glande hypophysaire

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal, à 0,05 cgr.

Dose moyenne. — 2 à 4 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas de myxœdème et d'infantilisme.

Prix réglementé :

Le flacon........... 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

IBOGAINE

L'Iboga est une plante de l'Afrique Occidentale et plus particulièrement du Congo, dont les nègres mâchent la racine pour se donner des forces nouvelles ou fournir un surcroît de travail.

Dans un mémoire présenté à l'Académie des Sciences, MM. Dybowski et Landrin ont montré que ses propriétés excitantes étaient dues à un nouvel alcaloïde auquel ils ont donné le nom d'Ibogaïne.

Etudiée par les professeurs Pouchet et Huchard, et les docteurs Chevalier, Landrin et De Clomesnil, l'Ibogaïne s'est révélée comme un médicament " névrosthénique, toni-cardiaque et excitant de la nutrition " (Société de thérapeutique).

L'expérimentation clinique est venue confirmer les données physiologiques. Le chlorhydrate d'Ibogaïne a été employé dans les Hôpitaux de Paris, avec succès, dans la neurasthénie, la grippe, la convalescence des maladies infectieuses, et dans un certain nombre d'asthénies et dilatations cardiaques.

Indications. — Les Dragées Nyrdahl à l'Ibogaïne seront prescrites dans les maladies suivantes : Neurasthénie, faiblesse, surmenage, dépression nerveuse, atonie musculaire, grippe, convalescence, anémie cérébrale, impuissance.

Dose. — 2 à 6 par jour (avaler sans croquer).

Prix : 5 fr. le flacon

Pharmacie MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

INTRAITS DAUSSE

Extraits physiologiques de végétaux stabilisés

Propriétés pharmacologiques. — Les intraits ou extraits physiologiques de végétaux stabilisés sont des produits préparés avec des plantes stabilisées, d'après le procédé *Perrot-Goris*, et débarrassés par des traitements successifs, à l'aide de dissolvants neutres, de toutes les matières étrangères et indifférentes qui accompagnent les principes actifs dans la plante, telles que chlorophylle, matières grasses, cireuses et résineuses.

Les intraits sont des préparations galéniques d'un nouveau genre, se recommandant par leurs propriétés spéciales, qui les rendent susceptibles d'applications nombreuses.

En raison de la facilité de leur titrage chimique et de leur évaluation physiologique, on peut être certain d'avoir toujours à sa disposition, non seulement un médicament de *titre uniforme et toujours semblable*, mais surtout aussi un médicament qui conserve *l'intégralité d'action de la plante.*

Caractères. — Les intraits sont des produits pulvérulents, très avides d'eau en général, et par conséquent très facilement solubles.

Intraits divers. — On prépare actuellement les intraits de Digitale, de Muguet, de Marron d'Inde, de Kola, de Valériane, etc. (Voir ces mots).

Laboratoire Pharm^que DAUSSE Aîné
4, rue Aubriot, PARIS

IODE

Produits Moride

Vin de Moride } iodo-tannique.
Sirop de Moride }

Produits Nyrdahl

Algarine Nyrdahl (Saccharure iodo-tannique phosphaté).

Voir les fiches particulières à ces différentes spécialités

Pharmacie MORIDE
20, rue de La Rochefoucauld
PARIS

IODÉYL FOURNIER

Combinaison iodo-organique
d'iode et peptone pure

Formes. — *Globules :* 0,01 cgr. iode métalloïdique combiné par globule.

Dose. — 3 à 6 globules par jour, à prendre aux repas.

Indications. — Celles de l'iode et de l'iodure : Adénopathies chroniques, Emphysème, Asthme, Artério-Sclérose, Syphilis.

Flacon de 60 globules : 4 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères
26, boulevard de l'Hôpital
PARIS

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale

Gouttes titrées : 20 gouttes contiennent 0 gr. 01 d'iode.

Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirops iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 % de l'iode total au lieu de 0 à 8 %); 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

Posologie. — Enfants : 10 à 20 gouttes par jour ; adultes : 40 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.

4 fr. 50 le flacon. — Prix réglementé

PÉPIN et LEBOUCQ
à COURBEVOIE (Seine)

I

IODONE ROBIN

Iode-Peptone au Peptone d'Iode

Composition. — La seule combinaison physiologique. Iode et peptone trypsique, contenant 16,48 0/0 d'iode.

Formes. — Gouttes : 20 gouttes correspondent, comme effet thérapeutique, à 1 gr. d'iodure de K.

Injectable : Ampoule à 1 cm^3

Indications. — Toutes celles de l'iode et de l'iodure de K : Artério-sclérose, Asthme, Syphilis, Rhumatismes, Goutte, Affections cardiaques, Obésité.

Tertiarisme : en injections, assimilation et tolérance parfaites.

Suppression absolue de tous les accidents d'iodisme.

Dose. — 10 à 50 gouttes 2 fois par jour au moment des principaux repas.

1 à 2 ampoules par 24 heures.

Prix { Le flacon : 4 fr. 50.
Ampoules : 5 fr.

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

IODURASE COUTURIEUX

(Ioduro-Enzymes)

Capsules dont chacune renferme : 0,50 cgr. d'iodure de potassium; 0,10 cgr. d'enzymes.

Propriétés thérapeutiques. — Identiques à celles des iodures *sans iodisme*.

Indications et doses. — *Affections du cœur :* 1 à 3 caps.; *Artério-sclérose :* 1 à 6 caps.; *Arthritisme et Goutte :* 1 à 4 caps.; *Asthme :* 1 à 3 caps.; *Goître :* 4 à 8 caps; *Obésité :* 2 à 4 caps.; *Saturnisme :* 2 à 6 caps.; *Syphilis :* 2 à 12 caps.; à prendre aux repas de préférence, pendant 15 jours, avec repos de 15 jours.

Le flacon : 5 fr.

C. COUTURIEUX

Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris

57, Avenue d'Antin, PARIS

JÉCOL

Médicament Hépatique complet

Composition. — Combinaison de différentes substances végétales, Evonyme, Boldo, Combretum ayant chacune une action spéciale sur le Foie.

Forme pharmaceutique. — Cachets très petits, dosés à 0,24 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — L'Evonyme est un *Cholagogue.* — Le Boldo est un *Tonique hépatique.* — Le Combretum est à la fois le plus actif des *Cholagogues* (suivant le Prof. Albert Robin), un *Tonique* et un *Diurétique.* — Le Combretum enfin, développe à un degré très élevé le *pouvoir antitoxique du Foie.*

Indications thérapeutiques. — Cholémies, Ictère, Cirrhose biliaire, Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Diabète.
Affections intestinales par insuffisance hépatique.
Tous les cas d'intoxication, d'empoisonnement, d'infection rendant nécessaire l'intervention énergique de la *défense hépatique.*

Dose et mode d'emploi. — 1 cachet après chacun des deux principaux repas (de préférence avec de l'eau alcaline), pour l'obtention d'une *action cholagogue prolongée.*
Pour obtenir un *effet cholagogue plus intense,* on pourra atteindre la dose de 4 cachets par jour, 1 après le petit déjeuner, 2 après le déjeuner et 1 après le dîner.

La boîte de 30 cachets : 4 fr. (réglementé)

LABORATOIRE DU JÉCOL

7, rue de la Force, Ste-MENEHOULD

KINEURINE MONCOUR

Glycéro-phosphate
de Quinine basique cristallisé

Sphérulines dosées à 0 gr. 10 cgr. par unité.

Doses, mode d'emploi et indications. — 1° Comme *Fébrifuge :* 6 à 12 sphérulines, le plus loin possible de l'accès. Pour les enfants de 5 à 10 ans, la dose est réduite de 2 à 4 sphérulines.

2° Comme *antinévralgique :* De 3 à 6 sphérulines par jour, prises 2 heures avant l'accès.

3° Comme *tonique :* De 2 à 4 sphérulines par jour, soit 1 ou 2 immédiatement avant les principaux repas.

(Communications à la Société de Pharmacie de Paris 2 février et 2 mars 1898).

Prix réglementé : 3 fr. la boîte

A. de MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, à Boulogne (Seine)

KOLA MIDY

(à base de kolium ou extrait complet de noix de kola fraîches)

Vin de Kola Midy, 2 à 3 verres à madère par jour et plus pour adultes. 1 à 4 cuillerées à soupe pour enfants.

Prix : 4 fr. 50

Kola granulée Midy, 4 à 6 cuillerées à café pour adultes et 1 à 2 cuillerées à café pour enfants.

Prix : 4 fr. 50

Kolium Midy (Extrait complet fluide), 2 à 5 cuillerées à café par jour dans un liquide sucré de préférence pour adultes. 1 cuillerée à café pour enfants.

Prix : 4 fr. 50

Chocolat Midy au Kolium, 3 à 5 tablettes pour adultes, 1 à 2 pour enfants.

Prix : 3 fr. 50

Propriétés thérapeutiques. — Tonique du cœur, aliment d'épargne.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle, Convalescences.

Produits réglementés

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré

PARIS (VIII[e])

KOLAYO

Combinaison de Kola et de Coca
(connue autrefois
sous le nom de *Kola-Coca Sauter)*

Forme. — Tablettes comprimées dragéifiées au chocolat, très agréables.

Dose. — *A sec :* 1 ou 2 pastilles par heure jusqu'à concurrence de 6 ou 8 pastilles par jour. On peut aller jusqu'à 15 à 20 pastilles en 24 heures dans les cas de grande fatigue.

En tisane : 2 tablettes dans une tasse d'eau bouillante sucrée ou non 2 à 3 fois par jour.

Dans du vin : Ecraser le contenu d'une boîte dans une bouteille de bon vin et laisser infuser 48 heures. A prendre 3 ou 4 fois par jour la valeur d'un verre à madère soit aux repas, soit entre eux.

Propriétés. — Le rouge de la Kola nourrit la fibre musculaire, tandis que la feuille de Coca agit sur les organes sécréteurs et en assure le bon fonctionnement. Régénérateur et Régulateur.

Indications. — Anémie, Chlorose, Débilité générale, Diabète, Neurasthénie, longues Convalescences. Tonique et stimulant pour cyclistes, touristes, chasseurs, etc.

Prix : 1 fr. 75 la boîte de 40 pastilles

Laboratoires SAUTER
49, rue de Paradis, 49 - PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

LACTOBACILLINE

Ferments lactiques purs et sélectionnés, c'est-à-dire sous la forme la plus active, de la Société *"Le Ferment"*, seul Fournisseur du Professeur *Metchnikoff*.

Comprimés : En boites de 8 tubes de chacun 6 comprimés.

Poudre : En boites de 10 tubes et 5 tubes contenant chacun la dose nécessaire pour ensemencer 1 litre de lait.

Bouillon : Extrait concentré de malt ensemencé avec des bacilles lactiques, en boites de 4 flacons de 60 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Transformation de la flore intestinale nocive en flore bienfaisante.

Doses et mode d'emploi. — *Comprimés :* 3 à 9 par jour; *Poudre :* 1/2 à 1 tube par jour; *Bouillon :* 1 flacon par jour.

A prendre après les repas dans un liquide ou avec des aliments sucrés.

Prix réglementés :

Le flacon de comprimés, 4 francs.

La boîte de 10 tubes Poudre, 8 francs.

— 5 — — 5 —

— de bouillon, 4 francs.

Comprimés de Lactobacilline glycogène : Ferments lactiques et amylolytique associés.

Propriétés thérapeutiques. — Celles des ferments lactiques dont l'action est renforcée par leur association avec le bacille glycobacter qui transforme en sucre les substances amylacées. La Lactobacilline glycogène est particulièrement indiquée dans les cas de digestion incomplète des amylacés.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 9 par jour, une demi-heure avant ou immédiatement après chaque repas.

Prix réglementé : la boîte, 5 francs

Société " LE FERMENT ", 13, rue Pavée PARIS

LACTOCHOL

Ferment lactique pur (Bacille Persan) et extraits biliaires dépigmentés.

Forme. — Comprimés.

Doses et mode d'emploi. — 1° *Adultes :* 4 à 12 comprimés par jour 1/4 d'heure avant le repas dans l'eau sucrée, miel, confiture, sirop (avaler sans mâcher); 2° *Enfants :* 2 à 6 comprimés par jour dans les mêmes véhicules; 3° *Nourrissons :* Un 1/2 comprimé délayé dans un peu de lait avant une tétée ou un biberon le matin ou le soir.

Propriétés thérapeutiques. — 1° Sur le tube digestif : Action eupeptique des plus remarquables. — 2° Sur l'intestin : Intervient comme régulateur de la fonction biliaire, puis agit rapidement sur la flore microbienne intestinale qu'il modifie.

Indications. — Entérite de l'adulte et du nourrisson, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique, dysenterie. *Constipation :* Rééducateur type de l'intestin, insuffisance biliaire, anorexie, dermatoses, furonculose, états toxiques et infectieux.

Laboratoire de Thérapie-Bio-Chimique
50, rue Rennequin, PARIS

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, naphtolphtaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés physiologiques et thérapeutiques. — Supprime immédiatement la constipation chronique ou accidentelle, les intoxications gastro-intestinales, fermentations putrides, Perturbations hépatiques et biliaires. Rétablit la sensibilité de la muqueuse, provoque la péristalse sans la moindre irritation intestinale. Augmente considérablement l'action modificatrice des ferments lactiques non associés en remédiant à leur insuffisance.

Mode d'emploi et doses. — Le soir au coucher un ou deux comprimés dans un peu d'eau sucrée. Augmenter les doses, si besoin est, pour obtenir un bon effet laxatif au réveil. Pour les enfants, un comprimé suffit.

La boîte de 6 tubes de 6 comprimés
2 fr. 50 (en France)

Laboratoires Biologiques André PARIS
1, rue de Châteaudun, PARIS

LACTOZYMASE B

Ferment lactique Bulgare

Comprimés de 0,50 cgr., préparés de telle façon que la conservation du ferment dans toute son activité est assurée pour au moins 18 mois.

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie gastro-intestinale.

Indications. — Gastro-entérites, entérites mucomembraneuses, fièvre typhoïde, appendicite, grippe, constipation, diarrhées, dermatoses (furonculose, urticaire, acné, eczéma, etc.), migraines, rhumatismes, artério-sclérose, etc.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 2 comprimés après chaque repas avec dessert sucré (compotes, confitures, infusion, etc.). — *Enfants :* 1 comprimé pris de la même façon. Le traitement devra être suivi pendant 4 à 6 semaines.

Prix réglementé :
la boîte de 30 comprimés, 3 fr. 50

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE
24, rue Caumartin, PARIS

LAXATIF MIRATON

ou Pastilles laxatives de Châtelguyon
créé en 1902, par Miraton

Nous recommandons à Messieurs les Docteurs de prescrire ce Laxatif — à base d'encélatine et de sels naturels de Châtelguyon — en insistant sur le nom de leur créateur, MIRATON.

Composition du Laxatif Miraton. — Encélatine ($C^{20}H^{14}O^{4}$) 0,08; sels naturels de la source Châtel-Guyon obtenus par évaporation dans le vide 0,05; sels recueillis par dépôt direct (oxyde de fer), magnésium, calcium, silicium 0,05; produits excipients : Sucre vanillé du Codex; gomme adragante Q. S.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 pastilles *à sucer*; Enfants : 1/3 ou 1/2 pastille *à sucer* de préférence le soir au coucher.

Propriétés thérapeutiques. — Laxative ou purgative suivant la dose.

Indications. — Constipation, migraines, dyspepsies, flatulences, entérites, appendicites, hémorroïdes, affections du foie et de l'intestin.

Prix réglementé : la boîte, 2 francs

Etablissement MIRATON
de CHATELGUYON

LAXATOL

à base de Phtaléine du Phénol

Forme. — Pastille d'un goût très agréable.

Doses et mode d'emploi. — A. *Comme purgatif :* 1° Enfants de 1 à 4 ans, 1/2 pastille le matin à jeun; 2° Enfants de 4 à 10 ans, 1/2 à 1 pastille le matin à jeun; 3° Enfants de 10 à 16 ans, 1 à 2 pastilles le matin à jeun; 4° A partir de 16 ans et pour adultes, 2 à 3 pastilles le matin à jeun ou le soir avant le coucher. — B. *Comme laxatif :* Le tiers ou la moitié des doses sus-indiquées.

Ne jamais avaler ces pastilles tout entières ou les croquer. Il faut les laisser fondre dans la bouche ou les dissoudre dans un peu d'eau.

Le soir, il faut toujours laisser écouler 2 heures après le dernier repas, et à jeun ou avant un repas de la journée, laisser au moins une demi-heure d'intervalle.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif, purgatif et désinfectant. Combat la fermentation putride de la stase fécale.

Indications. — Toutes celles de la Constipation.

Prix : la boîte de 30 comprimés, 1 fr. 50

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS — GENÈVE, Bellegarde (Ain)

LÉCITHINE CLIN

Extraite de l'œuf

Composition. — Les lécithines du commerce renferment souvent une forte proportion de matières grasses de l'œuf qui en diminuent le titre en phosphore et, par suite, l'activité thérapeutique; elles peuvent également, lorsqu'elles sont mal préparées, être en partie décomposées et contenir des bases choliniques libres dont l'ingestion peut provoquer des accidents. *La Lécithine Clin est de pureté garantie.*

Formes. — *Pilules de Lécithine Clin* à 0,05 par pilule.
Prix : le flacon de 50 pilules, 5 francs

Granulé de Lécithine Clin à 0 gr. 10 par cuillerée à café.
Prix : le flacon de 110 gr., 5 francs

Tubes stérilisés de 1 cm³ de Lécithine Clin à 0 gr. 05 par tube.
Prix : la boîte de 10 tubes, 5 francs

Tubes stérilisés de Lécithine Clin en association avec le fer, le gaïacol, la strychnine aux dosages usuels.

Doses. — Voie buccale : 20 à 30 cgr. par jour. Voie hypodermique : 5 à 10 cgr. (1 ou 2 tubes) par jour, *en injection intramusculaire.*

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

LEVURINE EXTRACTIVE COUTURIEUX

Principes solubles de la Levure de bière, correspond à 35 fois son poids de Levure fraîche et à 6 fois son poids de Levure sèche.

Comprimés, dosés à 0,20 de principe actif.

Ampoules injectables, de 3 cm³.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 2 à 9 comprimés par jour ou 1 à 2 ampoules. Avaler les comprimés à la façon de pilules. — *Enfants :* 1/2 comprimé 2 à 3 fois par jour ou une 1/2 ampoule. Faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Agit en modifiant le terrain, en le rendant impropre au développement microbien et comme anti-toxique.

Indications. — Furonculose, affections staphylococciques, entérites, dermatoses.

la boîte de 50 comprimés, 5 fr.
La boîte de 4 amp. injectables, 5 fr.

C. COUTURIEUX
Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris
57, avenue d'Antin, PARIS

L

LIPOCHOL BYLA

Cholestérine pure libre et combinée. Substitutif de l'huile de foie de morue.

Emulsion dont 1 cuillerée à bouche = 0,30 cgr. de cholestérine pure.

Pilules dont 1 = 0,20 cgr. de cholestérine pure.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées d'émulsion ou 5 à 10 pilules par jour et plus, 1/2 dose pour les enfants. On peut prendre ce médicament à n'importe quel moment de la journée.

Propriétés thérapeutiques. — Phagocytogène, antitoxique, antihémolytique.

Indications. — Tuberculose, lymphatisme et scrofule, anémie, chlorose déglobulisation, entérite, scorbut, purpura, ictères, intoxication, anémie des obèses. D'une manière générale chez tous les enfants *auxquels on prescrit actuellement l'huile de foie de morue.*

Prix réglementé :
Emulsion ou Pilules, le flacon, 6 fr.

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

LIPOIODINE CIBA

Composition. — Ether éthylique de l'acide diiodobrassidique, contenant 41 % d'iode. Cristaux blancs, inodorés, insipides, fondant à 37°. Insoluble dans l'eau, difficilement soluble dans l'alcool, très soluble dans l'éther et les huiles grasses.

Indications. — Celles de la médication iodurée.

Forme. — Comprimés à 0 gr. 30 de lipoiodine pure.

Dose. — De 1 à 6 comprimés par jour, après les repas principaux. Avoir soin de bien mâcher les comprimés.

Tube de 20 comprimés, 3 francs
— 10 — 1 fr. 50

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

LIQUEUR ANTIARTHRITIQUE

à la Résine de Gayac

Chaque cuillerée à bouche contient : Résine de Gayac, 0,40 cgr. ; Cocaïne, 0,005 mgr.

Indications. — Goutte, Rhumatismes, et en général toutes les manifestations de l'Arthritisme.

Dose. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : le flacon, 4 francs

Pharmacie L. MULLER

40, rue de la Bienfaisance, PARIS

LIQUEUR LAVILLE

Composition. — Quino-colocynthine et principes actifs de convallaria maialis, gentiane, scille, hermodactyle et fraxinus excelsior.

Propriétés thérapeutiques. — *Spécifique de l'accès de goutte;* exerce une action sédative sur la douleur; augmente l'élimination de l'acide urique.

Forme. — Vin médicamenteux.

Prix : le flacon, 10 francs

Dose et mode d'emploi. — Cas aigus graves : une cuillère à café dans une tasse de thé 2 heures avant ou 4 heures après le repas. Recommencer quelques heures après s'il est nécessaire. En cas de douleurs modérées, une cuillère à café le matin à jeun pendant 3 jours.

PILULES LAVILLE

A base de baies d'alkékenge et de silicate de soude, les Pilules Laville sont prises dans les périodes intercalaires des accès, à la dose de 4 à 10 pilules par jour.

Prix : le flacon de 100 pilules, 10 fr.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

LUSOFORME

(Formol saponiné)

1 cuillère à café ou 5 gr. = 1 gr. de Formol à 40 %.

Lusoforme médical. — *Antiseptique général de 1/2 à 1 0/0.*

Non toxique, non caustique, sans odeur, ne coagule pas les albuminoïdes, n'attaque pas les instruments de gomme ou métal.

Lusoforme brut. — *Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 0/0.*

Pour parquets, ustensiles des malades, linge sale (ne le tache pas), crachoirs, toute grosse désinfection. — 2 francs le kilo.

Indications. — Chirurgie courante, Accidents, Voies urinaires, Gynécologie, Accouchements, Stérilisation des mains et des instruments, Furoncles, Hyperhydroses, etc.

Le Lusoforme est un savon alcalin liquide contenant 20 0/0 de formol et stérilisé à l'autoclave.

Société Parisienne d'Antisepsie
15, rue d'Argenteuil, PARIS

LYCÉTOL VICARIO

Tartrate de diméthylpipérazine

Granulé effervescent : 1 mesure = 0,25 cgr. de Lycétol pur.

Dose et mode d'emploi. — De 2 à 6 mesures par jour dans un verre d'eau, de préférence à jeun ou entre les repas.

Propriétés thérapeutiques. — *Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.* Vingt fois plus actif que les sels de Lithine. Innocuité absolue. Assimilation facile sans aucun trouble digestif.

Indications. — Diathèse urique, Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques, Arthritisme, Diabète, Rhumatismes, Dermatoses.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Pour éviter toute substitution, prescrire Lycétol " VICARIO ".

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann, PARIS

LYMPHATINE BYLA

Ganglions lymphatiques

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Adénite, Engorgement ganglionnaire et Scrofule.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

LYSOL

Liquide brun, de consistance huileuse qui s'obtient en traitant le crésylol impur de houille par la potasse en présence d'un corps gras ou résineux.

Dose et mode d'emploi. — 10 à 30 grammes en solution dans l'eau bouillie, suivant les cas.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfectant, antiseptique non toxique le plus sûr, le plus puissant, le moins cher.

Indications. — Lavages des plaies de toute nature. Employé à la dose de 10 à 15 gr. par litre, il préserve la peau de toutes les *Rougeurs, Gerçures, Crevasses, Engelures, Dartres, Boutons, etc.* Il prévient, par son usage quotidien, l'*Influenza, les Fièvres contagieuses et les Maladies infectieuses.*

En flacons de 125 gr. : 1.25
250 gr. : 2 fr. - 500 gr. : 3 fr.
Le kilo : 5 fr.

Société du LYSOL
12, rue Martre, à CLICHY (Seine)

MARRON D'INDE (INTRAIT DE)

Extrait physiologique
de Marron d'Inde stabilisé

Propriétés thérapeutiques. — L'Intrait de Marron d'Inde, contrôlé physiologiquement, a une action médicamenteuse constante et uniforme. Son action est certaine et supérieure à l'alcoolature de plante non stabilisée. *Antihémorroïdaire* (Artault de Vevey).

Indications. — Hémorroïdes, varices, sédatif des douleurs hémorroïdales.

Posologie. — Dose moyenne : 1 cgr. par 24 heures.

Préparations d'Intrait de Marron d'Inde : *Pilules à 2 mgr.*

Solution d'Intrait de Marron d'Inde à 5 %. — Jusqu'à 30 gouttes par jour.

Laboratoire pharmaceutique
DAUSSE Aîné, 4, rue Aubriot, PARIS



MÉDICATION ARRHÉNIQUE COMPOSÉE

1° Arsenic et Fer

Marsyle Clin (Cacodylate de protoxyde de fer) : Renferme dans des proportions thérapeutiques l'arsenic et le fer au minimum d'oxydation.

Gouttes Clin à 0,025 par 5 gouttes.
Prix : le flacon de 25 cm^3, 5 fr.

Globules Clin à 0,025 par globule.
Prix : le flacon de 60 globules, 5 fr.

Tubes Stérilisés Clin à 0,05 par cm^3 (injection intramusculaire).
Prix : la boîte de 14 tubes de 1 cm^3, 6 fr.

Dose. — De 5 à 10 cgr. par jour.

Méthylarsinate de Fer Clin (Méthylarsinate de Fer).

Gouttes Clin à 0 gr. 01 par 5 gouttes.
Prix : le flacon de 25 cm^3, 4 fr.

Globules Clin à 0 gr. 01 par globule.
Prix : le flacon de 60 globules, 4 fr.

Tubes Stérilisés Clin à 0 gr. 05 par cm^3 (injection intramusculaire).
Prix : la boîte de 14 tubes de 1 cm^3, 5 fr.

Dose. — 3 à 10 cgr. par jour.

Laboratoire CLIN,

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

MÉDICATION ARRHÉNIQUE SIMPLE

Cacodylate de soude Clin, Métharsinate Clin
Médication arsenicale organique non toxique

I. — *Cacodylate de Soude Clin :*

Gouttes Clin 0 gr. 01 par 5 gouttes.
Prix : le flacon de 25 cm³, 3 fr. 50

Globules Clin 0 gr. 01 par globule, enrobés au gluten.
Prix : le flacon de 60 globules, 3 fr. 50

Tubes Stérilisés Clin. — Prix :

1° à 0,05	par cm3,	5 fr. la b.	de 20	amp.	de 1 cm3
—	—	2 50 1/2 b.	10	—	—
2° à 0.01	—	3 fr. la b.	20	—	—
à 0,02	—	3 50 la b.	20	—	—
à 0,03	—	4 fr. la b.	20	—	—
3° à 0,10	—	5 fr. la b.	14	—	—

Dose. — La dose moyenne est de 0,05 par jour, que l'on peut porter à 0 gr. 10 et à 0 gr. 15.

II. — *Métharsinate Clin.* (Méthylarsinate disodique chimiquement pur) :

Gouttes Clin, à 0 gr. 01 par 5 gouttes.
Prix : le flacon de 25 cm³, 4 fr.

Globules Clin, à 0 gr. 01 par globule, enrobés au gluten.
Prix : le flacon de 60 globules, 4 fr.

Tubes Stérilisés Clin, à 0 gr. 05 par cm³
Prix : la boîte de 14 tubes de 1 cm³, 5 fr.

Dose. — En moyenne 0 gr. 05 par jour.

Le traitement comprend généralement des périodes de huit jours environ alternant avec des périodes de repos d'égale durée.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

MÉLUBRINE

Phényldiméthylpyrazolonaminométhylène-sulfite de soude. Dérivé formaldéhydique de l'aminoantipyrine.

Cachets de 1 gr.; *comprimés* de 0,50 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, antipyrétique, analgésique et antinevralgique, la *Mélubrine* est caractérisée par une innocuité *absolue*. Elle est, en effet, dépourvue de toute toxicité. Elle ne produit aucun phénomène secondaire nocif à la dose de 1 gr. par kilogr. de lapin (l'antipyrine est mortelle à la dose de 0,75 cgr. par kilogr. d'animal).

Indications. — Toutes celles de l'antipyrine, de l'acide salicylique et des dérivés. Action élective particulière sur le rhumatisme articulaire aigu et chronique. Est le véritable agent spécifique de la polyarthrite rhumatismale en agissant directement sur l'élément pathogène causal.

Doses. — La *Mélubrine* s'emploie à la dose de 1 et même 2 gr. à la fois. Ces doses peuvent être renouvelées sans inconvénient jusqu'à 2, 3 et 4 fois par jour. Les malades chroniques peuvent en absorber en tout jusqu'à 150 et 200 gr.

MÉTHARFER BOUTY

Méthylarsinate de fer

Ampoules dosées à 0,05 cgr. par unité.
Gouttes dont 20 = 0,02 cgr. de métharfer.

Pilules dosées à 0,02 cgr. par unité.

Doses et mode d'emploi. — Par 24 heures : 3 à 5 pilules ou 20 à 50 gouttes ou une ampoule.

Propriétés thérapeutiques. — L'action cytogénique du Méthylarsinate unie au pouvoir hémoglobique du Fer fait du *Métharfer* le médicament le plus actif comme reconstituant général de l'organisme. Il est très facilement assimilable et les injections ne sont pas douloureuses.

Prix réglementé : la boîte, 4 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY
3bis, rue de Dunkerque, PARIS

MÉTHARSOL BOUTY

(Méthylarsinate de soude)

Ampoules dosées à 0,05 cgr. par unité.
Gouttes dont 20 = 0,02 cgr. de Métharsol.

Pilules dosées à 0,02 cgr. par unité.

Doses et mode d'emploi. — Par 24 heures : 3 à 5 pilules ou 20 à 50 gouttes ou une ampoule.

Propriétés thérapeutiques. — Excitateur de la nutrition et de l'assimilation, stimulant.

Indications. — Anémie, Chlorose, Cachexie, Syphilis, Fièvres paludéennes.

Prix réglementé : la boîte, 4 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY
3bis, rue de Dunkerque, PARIS

MÉTHYLARSINATE VICARIO

Méthylarsinate de soude chimiquement pur en petits comprimés présentant les avantages d'une désagrégation rapide et complète, d'une assimilation certainc et d'une posométrie absolument rigoureuse.

Méthylarsinate Vicario en comprimés dosés à 0 gr. 01 cgr.

Dose et mode d'emploi. — De 1 à 5 comprimés au commencement des principaux repas.

Dose maxima : 20 comprimés par jour

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, phagocytogène.

Indications. — Débilité, lymphatisme, arthritisme, neurasthénie, tuberculose et toutes les affections chroniques des voies respiratoires.

Pour éviter toute confusion, prescrire Méthylarsinate " VICARIO ".

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

MORIDE

Produits Moride. — Vin et Sirop de Moride (iodo-tannique) : Répondant à toutes les indications de l'iode et de l'huile de foie de morue. (Voir fiche spéciale).

Pilules Ferro-miellitiques de Moride : 2 à 3 à chaque repas. — Anémie, Chlorose. — Le flacon : 2 francs.

Vin de Gourou (Kola, Coca, Quinquina), 1 verre à madère à chaque repas. — Le flacon : 2 francs.

Vin Kalders (Kola, Coca, Caféine, Quinquina), 1/2 verre à madère à chaque repas. — Le flacon, 3 francs.

Dragées de Ruizia (Boldo, Eucalyptus et Créosote), 3 à 6 par jour. — Le flacon : 3 francs.

Produits Nyrdahl. — (Voir fiches spéciales Nyrdahl, Elixir de Virginie, Algarine, Dragées d'Ibogaïne), Argent Colloïdal, Choline, Fluène, Pelliséol.

Produits Leroy. — Cigarettes et Poudres américaines (anti-asthmatiques).

Pharmacie MORIDE

dépositaire des Produits Moride, Nyrdahl, Leroy

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

MORRHUETINE JUNGKEN

Forme et composition. — Liqueur non alcoolique à base de glycérine pure contenant : Iode métallique 0,015 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse, Quinine) en tout 0,15 cgr. Phosphate de soude : 0,15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable; pas d'irritation des muqueuses; pas de troubles des fonctions gastriques.

Propriétés. — Dépurateur. Tonique. Reconstituant.

Indications.— Anémie, lymphatisme, tuberculose, convalescences, etc.— Se prend en toutes saisons.

Doses et mode d'emploi. — Enfants au-dessous de 8 ans : 1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge. Enfants de 8 à 12 ans : 1 cuillerée à entremets. Adultes : 1 cuillerée à soupe après chaque principal repas.

Se prend pure ou avec un peu d'eau ordinaire ou gazeuse.

Prix réglementé :
Le flacon de 600 gr., 3 fr. 60

Laboratoire DUHÊME
à COURBEVOIE-Paris

MUGUET BYLA
(ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur et inaltérable de la plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de la plante fraîche ou 0,002 mgr. de convallamarine.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 gr. par jour à prendre en deux ou trois fois dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Tonicardiaque succédané de la digitale, hydragogue, pas d'intolérance ni d'accumulation.

Indications. — Hyposystolie, palpitations, tachycardie, asystolie, rétrécissement mitral, asthme cardiaque, dyspnée, œdèmes, endocardites.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

MUSCULOSINE BYLA

Plasma au suc musculaire total de viande de bœuf associé aux diastases oxydantes du sang.

Elixir agréable au goût.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à soupe par jour et plus suivant les cas.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, phagocytogène, orexique.

Indications. — Tuberculose, anémie et chlorose, atrophie infantile, diarrhée chronique, convalescences, surmenage, états consomptifs ou cachectiques, débilité sénile.

Prix réglementé :

Le 1/2 flacon, 4 fr. 50; le flacon, 8 fr.

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

NARCYL GRÉMY

Chlorhydrate d'éthylnarcéine synthétique

Sirop dosé à 0,03 de Narcyl par cuillerée à soupe.

Granules dosées à 0,02 par unité.

Doses. — *Adultes :* 3 à 6 cuillerées à soupe ou 5 à 8 granules par jour. *Enfants :* 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café par jour; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées à café par jour; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe ou 2 à 5 granules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Modérateur du pneumogastrique et du splanchnique. Antispasmodique.

Indications. — Affections spasmodiques des Voies respiratoires, Toux des Laryngites, Bronchites de la Coqueluche, et en particulier Toux de la Tuberculose, Gastralgie, Nervosisme, Insomnie.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

NÉOBIONE SAUTER

Albumino-Phosphatide naturel

Réunion collective et assimilable du phosphore en combinaisons organiques (lécithine, jécorine, céphaline, chlorophylle, etc.).

Forme. — Poudre sèche et jaunâtre en cachets.

Dose. — 1 cachet 3 fois par jour, 1/2 heure ou 1 heure avant le repas.

Propriétés physiologiques. — Les Phosphatides sont des éléments importants de la formation de la cellule et de son noyau, ainsi que de la production de la viscosité nécessaire aux cellules. Ils forment un stimulant continuel. Ils augmentent les globules rouges du sang et l'énergie physique et psychique ainsi que la force de résistance du malade.

Indications. — Toutes les maladies non fébriles nécessitant des fortifiants : Tuberculose, Rachitisme, Neurasthénie, Chlorose, Diabète, Débilité, etc.

Prix : 3 fr. 50 la boîte de 20 cachets

Laboratoires SAUTER
49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

NEOL

Constitution. — Préparation peroxy sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Oxygène et d'Ozone naissant.

Aspect. — Liquide incolore, saveur acidulée, odeur légèrement aromatique.

Propriétés — Aucune toxicité, épidermisant, cicatrisant, kératoplastique.

Indications. — Brûlures, Ulcérations cutanées et muqueuses, Plaies phagédéniques, Métrites, Angines.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (Néol 1 partie, eau 4 parties) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications.

Attouchements, *Badigeonnages* (Angines, Stomatites, Laryngites) Néol pur.

Pansements (Brûlures, Plaies diverses) Néol au 1/5 (Néol 1 partie, eau 4 parties).

Gargarismes : Deux cuillerées à soupe par verre d'eau (légèrement tiède).

Injections, grands lavages : Quatre cuillerées à soupe par litre d'eau, que l'on aura fait précéder d'une injection d'eau bouillie très chaude.

Présentation

Le gr. flac. de 380 gr. prix au public : 3,25
Le pet. flac. de 125 gr. prix au public : 1,75

Laboratoire du NÉOL
9, rue Dupuytren, PARIS

NÉOQUININE FALIERES

(Glycérophosphate de quinine pur)

Propriétés. — Rapidement absorbée, se montre à doses égales, plus actives que les sels ordinaires de quinine. — Action tonique, à petites doses, par ses deux éléments.

Formes. — 1° *Cachets de Néoquinine Falières*, 0 gr. 25 par cachet.
Prix : 1 fr. 50 la boîte de 8 cachets

2° *Suppositoires de Néoquinine Falières* à 0 gr. 15 par suppositoire (chaque suppositoire ne pèse que 2 gr.).
Prix : 1 fr. 50 la boîte
Enfants : 1 suppositoire; Adultes : 2; après avoir assuré la vacuité du rectum.

3° *Pilules de Néoquinine Falières*, 0 gr. 10 par pilule.
Prix : 1 fr. 50 le flacon de 20 pilules

4° *Tubes stérilisés de Néoquinine Falières*, 0 gr. 50 par cm^3.
Prix : 5 fr. la boîte de 6 tubes de 1 cm^3.

Néoquinine arsinée Falières

(Glycérophosphate et méthylarsinate de quinine)

Formes. — 1° *Cachets de Néoquinine arsinée Falières*, 0 gr. 25 par cachet.
Prix : 1 fr. 50 la boîte de 8 cachets

2° *Capsules de Néoquinine arsinée Falières* à 0 gr. 10 par capsule.
Prix : 1 fr. 50 le flacon de 20 capsules

3° *Tubes stérilisés de Néoquinine arsinée Falières*, 0 gr. 50 par cm^3.
Prix : 5 fr. la boîte de 6 tubes de 1 cm^3.

Laboratoires CLIN
20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

NÉOSALVARSAN

Produit arsénical n° 914 : obtenu par réaction du formaldéhydesulfoxylate de soude sur le dioxydiamidoarsénobenzol (606).

Propriétés physico-chimiques. — Poudre jaune d'odeur particulière. Solubilité parfaite dans l'eau. Solution neutre.

Avantages sur le Salvarsan. — Se dissout instantanément dans l'eau. Donne une solution neutre, on évite ainsi l'alcanisation du Salvarsan et les inconvénients pouvant résulter de l'hyper ou de l'hypoalcalinité des solutions. Est mieux toléré parce qu'il ne coagule pas les albuminoïdes et ne modifie pas la composition chimique du sang. Action thérapeutique équivalente, supérieure dans la Syphilis nerveuse.

Doses à employer. — Pour hommes : 0,60, 0,75, 0,90 cgr. de Néosalvarsan ; pour femmes : 0,45, 0,60, 0,75 cgr. ; pour enfants : 0,15 à 0,30 cgr. suivant âge ; pour nourrissons, 0,05 cgr.

Doses maxima. — Pour les hommes, 0 gr. 90 à la fois. Pour les femmes, 0 gr. 75 à la fois. Toutefois le traitement ne doit jamais commencer par des doses aussi élevées.

Contre-Indications. — Dans la Syphilis récente ou à la période secondaire aiguë, en présence de symptômes de syphilis cérébrale et principalement de méningite précoce, être très circonspect quant aux doses. Initier le traitement avec 0,15 ou 0,30 cgr. de Néosalvarsan.

Voir mode d'emploi page suivante

NÉOSALVARSAN

Mode d'emploi et préparation de la solution. — Voie intra-veineuse ou intra-musculaire. Jamais sous-cutanée. Pour injections intra-veineuses, qui est la méthode de choix, employer des solutions contenant 0,15 cgr. de Néosalvarsan dans 25 cm³ d'eau distillée fraîchement. Pour injections intra-musculaires, employer soit une solution aqueuse à 5 % environ car 1 gr. de Néosalvarsan dans 22 cm³ d'eau donne une solution isotonique, soit une suspension huileuse; cette dernière est parfaitement indolore. — En aucun cas, les solutions de Néosalvarsan ne doivent être employées après avoir été conservées. Il faut toujours employer une solution préparée extemporanément et sans attendre car sa stabilité est moindre encore que celle du Salvarsan. — Ne jamais chauffer une solution de Néosalvarsan.

Le Néosalvarsan est livré dans les dosages suivants : I) 0 gr. 15. — II) 0 gr. 30. — III) 0 gr. 45. — IV) 0 gr. 60. — V) 0 gr. 75. — VI) 0 gr. 90. — X) 1 gr. 50. — XX) 3 gr. — XXX) 4 gr. 50, correspondant respectivement à 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. de Salvarsan.

Pour les applications locales est livré également à la dose de 0 gr. 045 mgr.

Produits pharmaceutiques spéciaux CREIL
de la Compagnie parisienne de Couleurs d'aniline

Laboratoire E. DUPUTEL
CREIL (Oise)

NÉPHRINE BOUTY

Dragées dosées à 0,15 cgr. de Tissu desséché correspondant à 0,90 cgr. de Tissu frais.

Ampoules de 1 cm^3 et de 3 cm^3.

Doses et mode d'emploi. — 3 dragées dans les 24 heures, à prendre une 1/2 heure avant les repas ou une injection d'un cm^3 par jour.

Indications thérapeutiques. — Traitement de la Néphrite.

Prix réglementé :
La boîte de 50 dragées, 10 francs
La boîte de 6 ampoules 1 cm^3, 6 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3bis, rue de Dunkerque, PARIS

NEURÈNE

Bornéol soluble dans l'eau
$C^{10} H^{18} O$
Principe actif de la Valériane
Sans odeur

Solution contenant 0 gr. 10 de Bornéol par cuillerée à café. Une cuillerée à café de Neurène contient la partie active de 150 grammes de racine sèche de Valériane.

Doses. — *Adultes :* 3 à 5 cuillerées à café par jour. — *Enfants :* 1 à 3 cuillerées à café par jour, selon l'âge.

Mode d'emploi. — Chaque cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau sucrée et aromatisée à la fleur d'oranger.

Propriétés thérapeutiques. — *Tonique des centres nerveux.*

Indications. — Toutes les Affections nerveuses, Neurasthénie, Hystérie, Chorée, Spasmes, Insomnies nerveuses, Epilepsie.

Prix : le flacon, 5 francs

Laboratoire BRISSONNET
141, rue de la Tour, PARIS

NÉVRALTÉINE ROGIER

Ethoxyphényle-Aminométhane sulfinate de sodium
Comprimés dosés à 0 gr. 50 cgr.

Doses. — 4 à 8 comprimés par jour, pour combattre l'élévation de température (anti-thermique), 2 comprimés à la fois ou à 1/2 heure d'intervalle pour combattre migraines et névralgies (soulagement immédiat). Pour les enfants, voir prospectus.

Propriétés. — Anti-thermique, analgésique.

Aucune action sur le cœur dont elle est un tonique.

Spécialité réglementée. — Prix :
La boîte de 3 tubes (42 comp.), 4 fr. 50
Le tube, 1 fr. 65

Henry ROGIER, Pharm. de 1re Classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
3 et 5, boulev. de Courcelles, PARIS
Téléphone 533-70

NÉVROSTHÉNINE

FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates de soude, de potasse et de magnésie. Ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool.

Forme. — Gouttes concentrées, 20 gouttes contiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dose. — ~~10 à 20~~ gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle des éléments mêmes de l'organisme : Soude = Plasma sanguin; Potasse = Tissus nerveux; Magnésie = Substance grise.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc...

Aucune contre-indication

Prix réglementé : ~~3 francs~~

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel, PARIS

NOVARGAN HEYDEN

Protéinate d'argent à 10 % d'Ag.

Solutions de 10 à 15 % pour le traitement abortif de la blennorrhagie; dans les autres cas, solutions de 0,2 à 2 %.

Pommade à 10 % pour emploi oculaire.

Propriétés thérapeutiques. — Antiblennorrhagique non irritant.

Indications. — Blennorrhagie aiguë, maladies infectieuses oculaires.

NOVARINE VICARIO

Nouvel extrait actif du corps jaune de l'ovaire obtenu à l'aide de corps jaunes de brebis, de truies et de génisses.

Comprimés de Novarine Vicario
Le flacon, 5 francs

Dose et mode d'emploi. — De 2 à 6 comprimés aux repas et plus suivant les cas, jusqu'à disparition ou amendement notable des symptômes morbides.

Indications thérapeutiques. — Toutes les Affections, Etats morbides ou Irrégularités fonctionnelles provenant d'une insuffisance ovarienne. Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause et leur cortège : Leucorrhée, Hystéralgie cataméniale, Névralgie lombo-abdominale, Neurasthénie utérine, Céphalées rebelles; Insomnies, Sueurs, Bouffées de chaleur, Troubles digestifs et nerveux, Obésité, Arthritisme, Dermatoses, etc...

Prescrire Novarine " VICARIO "

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

NOVOCAINE CREIL

Chlorhydrate de p.
amidobenzoyldiéthylaminoéthanol

Spécialités. — Comprimés et solutions stérilisées pour anesthésies locale, régionale et lombaire ; solution huileuse pour urologie, solution à 10 % pour laryngologie.

Doses et mode d'emploi. — *Anesthésie locale* : Solution à 0,5 % contenant 25 gouttes de solution de supraréninе au 1/1000e par 100 cm³ de solution de Novocaïne stérilisée (professeur Reclus). — *Anesthésie régionale* : Solution à 2 %. — *Anesthésie lombaire* : Solution à 4 % (Docteur Chaput). — Pour badigeonnage : Solution à 10 %.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique aussi puissant que la cocaïne, sans action irritante, même à haute concentration, ni vaso-constricteur, ni vaso-dilatateur. La cocaïne étant vaso-constrictive, il est indispensable d'associer à la Novocaïne une petite quantité d'un vaso-constricteur, de préférence la suprarénine-synthétique " Creil " pour localiser son action et augmenter la durée de l'action. Les solutions de Novocaïne sont stérilisables.

Indications. — Dans les anesthésies locale, régionale et lombaire.

Produits pharmaceutiques spéciaux " CREIL "
de la Compagnie parisienne de Couleurs d'aniline
9, rue du faubourg Poissonnière
à PARIS (IXe)

Pharmacien : Laboratoire E. DUPUTEN
à CREIL (Oise)

NUCLÉO-FER-GIRARD

à base de Nucléinate de fer pur

Pilules contenant chacune 0,10 de Nucléinate de fer.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour avant le repas.

Propriétés thérapeutiques. — *Augmente en quelques jours de 30 à 90 0/0 la teneur des globules en hémoglobine.*

Indications. — Anémie et plus spécialement l'Anémie nerveuse.

Prix : le flacon, 4 francs

A. GIRARD

48, rue d'Alésia, PARIS

NYRDAHL

Produits NYRDAHL : Elixir de Virginie (Hamamelis et Capsicum); Algarine (Saccharure iodo-tannique phosphaté); Dragées d'Ibogaïne (Chlorhydrate d'Ibogaïne). *(Voir Fiches).*

Autres Produits NYRDAHL : Argent Nyrdahl, pommade à 15 % d'argent colloïdal soluble, le tube, 3 francs; Choline Nyrdahl, principe actif des lécithines (Maladies de la nutrition et Manifestations arthritiques), le flacon, 5 francs; Fluène, nouveau diurétique soluble dérivé de la théobromine, le flacon, 5 fr.; Pelliséol, pommade antidermatique à base de corps dérivés du tannin, la boîte, 1 fr. 50.

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

OPOTHÉRAPIE BYLA

1° *Sucs naturels inaltérables :*

Exo-Gastrine. — Exo-Hépatine. — Exo-Orchitine. — Exo-Ovarine. — Exo-Rénine. — Exo-Thyroïdine. — Exo-Hypophysine. — Exo-Pulmine. — Exo-Pancréatine.

2° *Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux soluble seulement dans le suc intestinal.*

Gastérase. — Orchitine. — Splénine. — Placentine. — Rénine. — Cérébrine. — Lymphatine. — Thyroïdine. — Hémoglobine. — Entérokinase. — Prostatine. — Hépatine. — Extrait biliaire. — Surrénine. — Hypophysine. — Ovarine. — Flavéine.

Voir la page
de chacun de ces produits

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

(Voir page de chaque produit :
" Sphérulines ")

Extrait gastrique Moncour. — Extrait hépatique Moncour. — Extrait pancréatique Moncour. — Extrait entéro-pancréatique Moncour. — Extrait intestinal Moncour. — Extrait de bile Moncour. — Extrait rénal Moncour. -- Corps thyroïde Moncour. — Poudre ovarienne Moncour.

Autres préparations Moncour. — Extrait de muscle lisse, extrait de musclctrié, moelle osseuse, myocardine, poudre surrénale, thymus, etc., etc.

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

ORCHITINE BYLA

(Glande interstitielle)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,15 cgr.).

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans les Déchéances physiologiques ou toxiques, la Débilité sénile, les Névroses, l'Impuissance et le simple Surmenage.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

OUATAPLASME

DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient aseptique, instantané, stérilisé à 130°

Se prépare instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses.

Propriétés thérapeutiques. — Emollient, sédatif, résolutif.

Indications. — Dermatoses aiguës et chroniques (Eczéma, Impétigo), Phlegmasies diverses (Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du sein, Phlébites, Erysipèles, Brûlures, Entorses, Plaies contuses), Affections oculaires : Conjonctivites, Kératites.

Le paquet............	2 »
Le demi-paquet	1 25
Le quart de paquet...	0 70

SABATIER, Pharmacien

10, rue Pierre-Ducreux, PARIS (XVIe)

OVARINE BYLA

(Glande ovarienne)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans tous les troubles dûs à une insuffisance ovarienne : Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménopause, Neurasthénie féminine, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

O

OVIGÉNINE BOUTY

Ovarine

Dragées dosées à 0,12 cgr. d'Ovaire de Génisse desséché correspondant à 0,80 cgr. d'Ovaires frais.

Ampoules de 1 cm^3 et de 3 cm^3

Doses et mode d'emploi. — 1 dragée avant chacun des deux principaux repas ou une injection d'un cm^3 par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Supplée à l'insuffisance ovarienne quelle qu'en soit la cause.

Indications. — Ménopause naturelle et artificielle et ses conséquences : Aménorrhée, Dysménorrhée, Dystrophie ovarienne, etc.

Prix réglementé :

La boite de 50 dragées, 10 francs
La boite de 6 ampoules 1 cm^3, 6 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

' aboratoires BOUTY

de Dunkerque, PARIS

OVO-LÉCITHINE BILLON

Propriétés thérapeutiques. — Stimule la nutrition générale, provoque une hyperleucocytose durable, augmente le nombre des globules rouges, permet une parfaite utilisation des matériaux nutritifs azotés, accroit la teneur du sang en hémoglobine, empêche la déminéralisation phosphorée, relève l'énergie contractile du cœur et des muscles lisses et striés en général.

Formes et doses. *Dragées* à 0 gr. 05, 4 à 6 par jour (enfants 2 à 3); *Granulés* à 0 gr. 10 par cuillerée à café, 2 à 3 par jour (enfants 1 à 2); *Injections intramusculaires*, 1 par jour.

Indications. — Neurasthénie, Dépression nerveuse, Chlorose et Anémies de toutes natures, Lymphatisme et Rachitisme, Troubles de croissance, Cachexie sénile, Période de convalescence des états infectieux.

Dépôt Général, Renseignements et Echantillons :

Etablissements POULENC Frères

92, rue Vieille-du-Temple, PARIS

OVULES ROCHE

au Thigénol à 30 %
(Voir également page "Thigénol")

Propriétés thérapeutiques. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnantes, et puissamment résolutives. On constate au bout de quelques jours du traitement par les ovules au Thigénol, la sédation complète des douleurs, et après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocèdent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une opération chirurgicale.

Indications. — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métrorrhée, etc.

Prix réglementé :
4 fr. la boîte de 6 ovules

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, place des Vosges, PARIS

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Substance renfermant tous les principes actifs de la glande thyroïde privée de toxine par un procédé spécial ; est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité et tous les états dûs à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Dragées renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. Une à deux dragées par 24 heures, prises de préférence le matin à jeun.

Prix au public :
8 francs le flacon de 50 dragées

Laboratoires biologiques
André PÂRIS

1, rue de Châteaudun — PARIS

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire : corps jaune et cellules interstitielles.

Formes. — Dragées, dosées à 0,10 cgr. de substance ovarique totale.

Propriétés thérapeutiques. — Remédie efficacement à toutes les affections provoquées par l'insuffisance ovarienne congénitale ou acquise (post-opératoire).

Indications. — Troubles de la menstruation, irrégularités, insuffisance, douleurs, retentissements pathologiques de l'ovariotomie, accidents de la ménopause, etc.

Dose. — 2 à 6 dragées par jour au moment des repas.

Prix : Le flacon de 60 dragées 6 francs

Laboratoires biologiques
André PÂRIS

1, rue de Châteaudun, PARIS

PANCRÉATINE BYLA

Pilules dosées à 0,20 cgr. de Pancréatine absolue pure.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 pilules à la fin de chacun des deux principaux repas.

Propriétés thérapeutiques. — Digestif puissant, orexique.

Indications. - Dyspepsies, Gastralgies, Nausées, Digestions difficiles ou incomplètes, Renvois, Vomissements, Diabète maigre.

Prix réglementé :
3 fr. le flacon de 50 pilules

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

P

PANTOPON " ROCHE "

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium précipités sous forme de chlorhydrates solubles et injectables

0 gr. 01 cgr. de PANTOPON "ROCHE" =
0 gr. 50 cgr. de teinture d'opium.
0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium.
0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et mode d'emploi.

Voie Buccale.

Adultes. — 0 gr. 02 cgr. à 0 gr. 06 cgr. en potions, sirops, cachets, pilules, etc., par 24 heures.

Enfants. — 0 gr. 005 mgr. à 0 gr. 01 cgr. par année d'âge et par 24 heures.

COMPRIMÉS DE PANTOPON "ROCHE"

1 comprimé = 0 gr. 01 cgr. de Pantopon

Adultes. — 2 à 6 par 24 heures et plus.

Enfants. — 1/2 à 1 par année d'âge et par 24 h.

Le flacon de 20 comprimés, Prix : 1 fr. 50

Voie Hypodermique.

AMPOULES DE PANTOPON "ROCHE"

Solution stérilisée à 2 pour 100 non irritante
1 ampoule = 1 cm³ = 0 gr. 02 cgr. de Pantopon " Roche "

Adultes. — 1 à 3 par 24 heures et plus.

Enfants. — 1/4 à 1/2 ampoule par année d'âge et par 24 heures.

La b^te de 6, Prix : 3 fr. — La b^te de 12, Prix : 5 fr.

Indications thérapeutiques. Toutes celles de l'opium, de la morphine et dérivés.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, place des Vosges, PARIS

PANUTRINE

Obtenue par des procédés et des machines spéciales

Poudre d'huile de foie de morue, contenant tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, associés aux phosphates organiques.
(Glycéro-phosphate de chaux, Lécithine)

Forme. — Poudre d'ingestion et de digestion très faciles. Tolérance parfaite.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de lait. La cure peut être poursuivie, même pendant la saison chaude.

Propriétés. — Bénéficie de toutes les propriétés curatives, fortifiantes et reconstituantes de l'huile de foie de morue sous la forme la plus agréable. Régénérateur par excellence.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue : Scrofule, Rachitisme, Tuberculose, Maladies de la peau, Débilité, Syphilis, Maladies de la gorge, Phtisie pulmonaire, etc.

Prix : la boîte, 3 fr. 75

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

PARALACTINE

Gros bacille bulgare sélectionné

Formes. — *Comprimés.* — *Bouillon végétal peptoné.*

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés délayés dans un peu d'eau sucrée froide ou tiède, 3 fois par jour.

Indications thérapeutiques. Traitement rationnel de l'Entérite et de toutes les Affections gastro-intestinales.

Prix réglementé :

Le flacon de 60 comprimés ou le flacon de bouillon, 3 fr. 50.

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

PASTILLES DE FORMALINE HELIOS

Les Pastilles de *Formaline*, pesant chacune 1 gramme, sont composées d'Aldéhyde Formique polymérisé, d'une pureté parfaite, sans addition d'aucune substance étrangère.

Elles portent, comme garantie de provenance et de composition, la marque " *Formaline* ".

Seules les pastilles portant cette inscription sont reconnues aptes à donner, par gazéification dans les *Formolateurs*, le dégagement d'Aldéhyde Formique, prescrit par le Comité d'Hygiène. Par l'emploi d'autres produits, l'effet désinfectant peut être considérablement amoindri.

Chaque pastille fournit, par la gazéification, 1 gramme de gaz à 100 % d'Aldéhyde Formique (ce qui correspond à 2,66 grammes de *Formaline* liquide.

Par l'emploi de ces pastilles, le dosage du désinfectant est donc excessivement précis autant que simple. En outre, comme elles sont entièrement neutres et non toxiques, leur maniement est absolument sans danger.

Voir page : *Formolateurs Hélios*

Prix : le kilo ou 1000 pastilles, 14 francs

Même remise que sur Formolateurs

27, rue des Petits-Hôtels, PARIS

PASTILLES DE MACKENSIE

à la Résine de Gayac

Résine de Gayac : 0,20 cgr.
Cocaïne : 0,001 mgr.

Indications. — Maux de gorge, Angine, etc. Spécifique des Amygdalites aiguës.

Dose. — Une pastille toutes les heures.

Prix : la boîte, 2 francs

Pharmacie L. MULLER

40, rue de la Bienfaisance, PARIS

PASTILLES MIRATON

ou Pastilles laxatives
de Châtelguyon
créées en 1902, par Miraton

Composition. — Encélatine ($C^{20} H^{14} O^{4}$) 0,08; Sels naturels de la source Châtelguyon obtenus par évaporation dans le vide 0,05; Sels recueillis par dépôt direct (oxyde de fer), magnésium, calcium, silicium 0,05; Produits excipients; Sucre vanillé du Codex; Gomme adragante Q. S.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 pastilles *à sucer*; Enfants : 1/3 ou 1/2 pastille *à sucer* de préférence le soir au coucher.

Propriétés thérapeutiques. — Laxative ou purgative suivant la dose.

Indications. — Constipation, Migraines, Dyspepsies, Flatulences, Entérite, Appendicite, Hémorroïdes, Affections du foie et de l'intestin.

Prix réglementé : la boîte, 2 francs

Etablissement MIRATON
de CHATELGUYON

PENGHAWAR " VICARIO "

Hémostatique végétal, stérilisé, constitué par les poils jaunâtres et soyeux de certaines fougères arborescentes croissant à Java, Sumatra, Bornéo, dans la Haute-Asie, en Cochinchine et au Tonkin. Après triage, ces fibres sont stérilisées à l'autoclave à 120°.

Penghawar Vicario :

La boîte, 0 fr. 60; l'étui, 2 francs

Chaque prise de Penghawar dans l'étui est séparée par une rondelle de coton entourée de gaze.

Mode d'emploi. — En petits tampons qu'on applique sur les points hémorragiques.

Indications thérapeutiques. — Dans les Epistaxis spontanées ou à répétitions (en remplacement de l'amadou, de l'antipyrine ou du perchlorure de fer). Dans les Plaies opératoires des fosses nasales, pour éviter une perte de sang inutile et dégager ensuite le champ opératoire. Comme préventif d'une Epistaxis secondaire après l'emploi de l'Adrénaline.

Pour éviter toute confusion prescrire Penghawar " VICARIO "

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

PEPSORTHINE

Combinaison des Stomachiques (Pepsine, Papaïne, Pancréatine) avec le Peroxyde de Manganèse et le Bicarbonate de Soude) préparée sous le contrôle scientifique du Dr P. RODARI, spécialiste des maladies gastro-intestinales.

Forme. Boîte de 120 pastilles comprimées.

Dose. — 3 à 6 tablettes avec un peu d'eau, de suite après chaque repas.

Propriétés. — Stomachique de grande valeur. Facilite et aide la digestion. Aux effets digestifs des stomachiques, la *Pepsorthine* ajoute une action antiseptique efficace par la production d'oxygène naissant (MgO^2) dans le milieu stomacal, tandis que le Bicarbonate de soude neutralise l'excès d'acidité et favorise l'évacuation des gaz.

Indications. — Gastrite aiguë, Catarrhes chroniques de l'estomac avec sécrétion ralentie du suc gastrique.

La boîte de 120 tablettes : 4 francs

Laboratoires SAUTER
49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Véritable ferrugineux assimilable

Forme pharmaceutique. — Gouttes concentrées de Peptonate de Fer. — Vin Robin au Peptonate de Fer. — Elixir Robin au Peptonate de Fer.

Composition. — Véritable combinaison de Peptone de fer.

Propriétés pharmaceutiques. — Rend le fer parfaitement assimilable, n'a ni la saveur styptique, ni la réaction des autres ferrugineux. C'est un sel défini parfaitement stable qui ne se décompose pas par son contact des aliments. Ne produit ni constipation ni diarrhée, ne nécessite aucun travail digestif et ne provoque jamais la pesanteur d'estomac.

Propriétés physiologiques et thérapeutiques. — Augmente la capacité respiratoire du sang, multiplie la richesse des hématies en hémoglobine et active les échanges.

Indications. — Toutes les Anémies, la Chlorose, la Débilité.

Doses et mode d'emploi. — Gouttes : *Adultes,* 10 gouttes 2 fois par jour aux principaux repas dans liquide ou aliment quelconque. Augmenter progressivement de 2 gouttes à chaque repas jusqu'à la dose normale de 20 à 25 gouttes à chaque repas. On peut atteindre 30 à 40 gouttes 2 fois par jour. *Enfants,* 1 goutte environ par année d'âge. — Vin : *Adultes,* 1 verre à liqueur avant ou après chaque repas. *Enfants,* 1 cuillerée à bouche ou à café suivant l'âge. — Elixir : 1 cuillerée à bouche après chaque repas.

Prix : Gouttes, 4 fr. 50 ; Vin, 4 fr. 50 ; Elixir, 4 fr. 50

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

PEPTONE BYLA

Poudre blanche soluble, entièrement désodorisée, agréable au goût. Valeur nutrimentaire représentée par 10 fois son poids de viande fraîche. Contient 14 % d'azote total.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à bouche par jour aux repas dans un liquide chaud ou froid (bouillon de préférence).

Propriétés thérapeutiques. — Digestif puissant, reconstituant, analeptique.

Indications. — Traitement de la Dénutrition et des Affections des voies digestives, Anémie, Cachexies, etc.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

Les. Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

PÉRICOLS

Pansement péri-utérin
plus aetif que les ovules

Forme Discoïde pouvant s'appliquer dans les euls de sacs utérins autour du col.

Composition. — A base de glycérine médicamenteuse.

1° Périeols bellado-iodurés;

2° Péricols à l'Ichtyol ou au Thigénol;

3° Péricols canadiens (extrait d'hamamelis et d'hydrastis, ete.).

Indications thérapeutiques. — 1° *Obstétrique :* Dilatation lente du col, après l'aceouehement ou l'avortement quand le col est lent à revenir sur lui-même; 2° *Gynécologie :* Métrites dc toute nature, Salpyngites, etc.

Prix réglementé :
La boîte de 6, 3 fr. 75

Docteur LEGROS & C°

1, place de la République, PARIS

PÉRISTALTINE CIBA

Nouveau glucoside soluble extrait de l'écorce de Rhamnus Purshiana (Cascara Sagrada)

Propriétés. — Possède l'action laxative douce des préparations de Cascara Sagrada sans les effets secondaires fâcheux (Coliques, Nausées, Selles sanguinolentes, etc.).

Agit également par la voie hypodermique.

Formes. — Voie buccale : comprimés à 0,05 cgr. en tubes de 20 comprimés, 1 fr. 50 le tube ; Voie hypodermique : ampoules stérilisées injectables à 0,30 cgr. en boîtes de 5 ampoules, 2 fr. 50 la boîte.

Doses et mode d'emploi. — Par voie buccale : *Adultes,* 0,15 à 0,30 cgr. (3-6) comprimés); *Enfants,* 0,05 à 0,15 cgr. (1-3 comprimés). — Par voie hypodermique : 0,30 à 0,60 cgr. (1-2 ampoules).

Nota. — L'effet se produisant au bout de 10 à 12 heures, quel que soit le mode d'administration, il est recommandé d'administrer la Péristaltine dans la soirée.

Société pour l'Industrie chimique

à SAINT-FONS (Rhône)

PHOSPHOTAL CLIN

(Ether phosphoreux de la créosote)

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire et reminéralisateur, à minimum de toxicité. Traitement des maladies des voies respiratoires et particulièrement des formes secrétantes : Tuberculose pulmonaire, Bronchites chroniques, fétides, Grippes, etc.

Formes. — *Capsules* titrées à 0,20 cgr.

Prix : le flacon de 96 capsules, 5 fr.

Emulsion titrée à 0,50 cgr. par cuillerée à café.

Prix : le flacon de 200 cm³, 5 francs.

Ampoules à 0 gr. 10 par cm³ (amp. de 3 cm³).

Prix : la boîte de 10 tubes, 5 francs

Doses et mode d'emploi. -- *Capsules :* 4 à 6 par jour.

Emulsion : De préférence en lavement, 1 à 2 cuillerées à café d'émulsion mélangée à 1/2 verre de lait tiède.

Ampoules : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

PHYTINATE DE QUININE CIBA

Sel de quinine de l'acide phytinique

Combinaison définie du principe phospho-organique des graines végétales avec l'alcaloïde principal du quinquina. Contient 57 % de quinine et 43 % d'acide phytinique.

Comprimés argentés à 0 gr.10; le flacon de 50 comprimés, 3 francs.

Doses et mode d'emploi. — Variables suivant l'indication. 1 gr. de Phytinate correspond à 0 gr. 75 de chlorhydrate ou 0 gr. 70 de sulfate de quinine.

Propriétés thérapeutiques. — Antinévralgique, tonique, fébrifuge, stimulant des contractions utérines.

Indication spéciale. — Paludisme chronique, Cachexie paludéenne.

Société pour l'Industrie Chimique

à SAINT-FONS (Rhône)

PHYTINE CIBA

Sel acide de chaux et de magnésie
de l'acide phytinique
Principe phospho-organique
des graines végétales

Cachets à 0 gr. 50 : la boîte de 20 cachets, 4 francs.
Granulé à 10 % : le flacon de 100 gr., 4 francs.
Gélules à 0 gr. 25 : la boîte de 40 gélules : 4 francs.

Doses et mode d'emploi. — 1-2 gr. par jour pour adultes, en prises de 0 gr. 50; 0 gr. 25 à 1 gr. par jour pour enfants, en prises de 0 gr. 25.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, apéritif.

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

P

PILULES ANTI-HÉPATIQUES

DU Dr DEBOUZY

Opothérapie biliaire

Chaque pilule du Dr Debouzy contient 0,30 cgr. d'extrait total de bile sélectionnée et stérilisée.

Indications. — Toutes les Affections hépatiques : Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Entéro-colite.

Doses et mode d'emploi. — **Lithiase biliaire** *avant la colique hépatique*, 6 pilules par jour; *pendant la colique hépatique*, 1 pilule toutes les heures, puis toutes les deux heures jusqu'à effet; *après la colique hépatique*, 6 pilules par jour en moyenne, pendant 20 jours par mois. La dose utile peut varier suivant les malades de 2 à 12 pilules par jour. — **Affections hépatiques** (insuffisance biliaire), *Maladies des pays chauds*, 6 pilules par jour, en moyenne; à titre préventif, 4 pilules par jour pendant 10 à 15 jours par mois. — **Entéro-colite muco-membraneuse**, 6 pilules par jour, continuer pendant quelques mois pour rendre la guérison définitive.

Les *Pilules du Dr Debouzy* doivent être prises au début ou au milieu des repas, en 2 ou 3 fois par jour.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

PILULES DE MOUSSETTE

à l'Aconitine cristallisée

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative et analgésique surtout remarquable dans la zone du trijumeau.

Forme. — Pilules dosées à 1/5e de mgr. d'aconitine cristallisée et 5 cgr. de quinium par pilule. — Prix : le flacon de 20 pilules, 3 fr.

Doses. — Deux pilules le premier jour, une le matin et une le soir ; on prendra trois pilules le second jour, en trois prises espacées, si aucun soulagement ne s'est produit. On n'atteindra la dose de quatre pilules qu'exceptionnellement en surveillant la tolérance du malade (la sensation de fourmillement dans la langue, les lèvres et la face est un signe prémonitoire d'intolérance). Après chaque ingestion de *Pilules de Moussette* prendre une infusion chaude. L'administration simultanée d'un purgatif énergique est conseillée par le Dr Fuchs.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

PILULES DE QUASSINE FRÉMINT

0,02 cgr. de Quassine amorphe titrée en Quassine cristallisée et 0,08 cgr. extraits amers par pilule.

Dose. — 1 à 2 pilules dans une cuillerée d'eau, 10 minutes avant les repas de midi et du soir.

Propriétés. — Excitent l'appétit, facilitent la digestion et l'assimilation, accélèrent les sécrétions et tonifient l'ensemble de l'appareil digestif.

Indications. — Anorexie, Dyspepsie, Hyposthénie gastro-intestinale, Coliques hépatiques et néphrétiques.

Prix réglementé : 3 francs

Laboratoire FREYSSINGE
6, rue Abel, PARIS

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $NH < \frac{CH^2}{CH^2} > NH$, alcalin organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au Codex Français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0,20 cgr. Pipérazine pure par mesure ou cuiller à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 mesures par jour comme préventif; 4 à 6 mesures par jour, crises aiguës, dissoutes dans un verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 % des composés de l'acide urique; réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artériosclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue sur cœur, estomac, vaisseaux.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré

PARIS (VIIIe)

PLACENTINE BYLA

(Tissu placentaire)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (0 gr. 15).

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Galactogène.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

POUDRE AMÉRICAINE LEROY

Composition. — Piper cubebis et Grindelia Robusta.

Mode d'emploi. — Mettre dans une soucoupe une cuillerée à café de poudre environ, et en former un petit tas conique dont on allumera le sommet.

Indications. — Asthme, Coryza, Bronchite chronique, Emphysème et dilatation bronchique.

Prix : la boîte, 1 fr. 50

Pharmacie MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

POUGUES

	Source St-Léger	Source Alice
Acide carbonique libre.....	2.1178	2.0000
Bicarbonate de soude	1.0302	0.1860
— — potasse.	0.0699	0.0260
— de chaux	1.8934	2.1040
— de magnésie..	0.4554	0.3040
— de fer	0.0600	0.0260
Sulfate de soude...........	0.1768	0.2300
Chlorure de sodium	0.1417	0.2120
Chlorure de lithium	0.0468	0.0060
Silice......................	0.0340	0.0290
Total	6.0260	5.1230

Indications thérapeutiques :

Pougues Saint-Léger. — Maladies de l'estomac et des intestins. — Neurasthénie. — Anémie. — Chlorose. — Convalescences. — Diabète. — Goutte. — Rhumatisme.

Pougues Alice. — Allaitement maternel. — Arrêt des Vomissements de la grossesse. — Formation du système osseux. Croissance. — Dentition. — Guérison des Diarrhées infantiles.

Cie de POUGUES

15 et 17, rue Auber — PARIS

PROSTATINE BYLA

(à gr. 15)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal.

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Hypertrophie de la Prostate et sénilité virile.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

PROTÉINATE D'ARGENT HEYDEN

En prescrivant *Protéinate d'argent Heyden*, l'exécution de l'ordonnance sera moins onéreuse pour le malade, qu'avec une autre prescription.

Solutions de 0,25 à 1 °/0
dans la blennorrhagie chronique

Solutions de 2,5 à 5 °/0
pour le traitement abortif

Pommade de 0,3 à 1 °/0 pour plaies aux jambes

Propriétés thérapeutiques. — Action anti-blennorrhagique éprouvée.

Indications. — Blennorrhagie, Ulcus cruris.

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^{e})

PYRAMIDON CREIL

Diméthylaminoantipyrine

Cachet Cépé : Pyramidon Creil 0,30 cgr.; Caféine 0,05 cgr.

Comprimés dosés à 0,30 et à 0,05 cgr. de Pyramidon Creil. — Vendus en boite d'origine.

Doses. — *Adultes :* 0,30 cgr. à la fois, 1 gr. par jour. — *Enfants :* autant de cgr. que d'années d'âge; 3 à 4 heures d'intervalle entre chaque dose.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et antithermique, 4 fois plus actif que l'antipyrine du Docteur Knorr, ne fatigue pas l'estomac.

Indications. — Fièvre chronique des tuberculeux, Fièvre typhoïde, Erysipèle, Pneumonie, Rhumatisme articulaire, Influenza, Grippe, Migraines, Névralgies, Céphalalgies, Névrites, Douleurs ataxiques, Menstruation, Asthme, Gastralgie, Odontalgie.

Produits Pharmaceutiques spéciaux CREIL
de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

9, rue du faubourg Poissonnière
à PARIS (IXe)

Pharmacien : **Laboratoire E. DUPUTEL**
à CREIL (Oise)

QUINA LAROCHE

(Extrait complet des 3 Quinquinas)

Composition. — Extrait complet des 3 sortes de quinquinas : quinquina gris Loxa vrai, quinquina jaune royal, quinquina rouge. Préparé en épuisant le mélange des quinquinas par dialyse, il concentre sous un petit volume tous les éléments actifs, amers, astringents et aromatiques contenus dans les écorces. Principaux éléments : quinine, cinchonine, acide quinotannique, acide quinine, etc.

Propriétés. — Tonique et eupeptique.

Formes. — Quina Laroche simple, phosphaté, ferrugineux.

Prix : 5 fr. le flacon ; 3 fr. le 1/2 flacon

Doses. — *Adultes :* un verre-mesure après chaque repas ; *Enfants :* le tiers ou la moitié de cette dose étendue d'eau selon l'âge.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Propriétés thérapeutiques. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Technique de l'emploi. — Remplacer le bouchon du tube en métal par la canule; introduire doucement cette canule dans l'anus, en ayant soin de presser légèrement sur l'extrémité opposée du tube, de façon à obtenir l'expulsion d'une petite quantité de pommade; incliner le tube dans tous les sens pour que le pansement soit bien appliqué sur la paroi ano-rectale; puis retirer le tube très lentement. Dévisser alors la canule, la laver soigneusement à l'eau bouillante et la remettre dans son tube en verre.

Prix réglementé :
La boîte complète avec canule, 4 fr.

164, rue Saint-Honoré, PARIS

RÉNINE BYLA

Glande rénale

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 4 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas d'insuffisance rénale, néphrites aiguës ou chroniques, accidents de l'urémie et de l'albuminurie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

RIBES NIGRUM BYLA
(ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur inaltérable de la plante fraîche (cassis)

36 gouttes = 1 gramme de la plante fraîche

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour à prendre dans un peu d'eau chaude avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur de la nutrition. Diurétique actif. Stimulant des fonctions hépatiques et gastro-intestinales. Antiarthritique.

Indications. — Rhumatisme chronique, arthritisme, gravelle, obésité, eczéma, urticaire.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

S

SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT : Eau de table type

Minéralisation totale : 2 gr. 4049

Acide carbonique : 3 gr. 774

1° Dyspepsie .... { Hypochlorhydrie. Hypopepsie. Hyposthénie.

2° Anorexie.

3° Lithiase urinaire. { Urique. Phosphatique.

4° Lithiase biliaire : adjuvant de Vichy.

5° Réminéralisation de l'organisme { Tuberculose (méthode Ferrier). Diabète.

SOURCE ROMAINE : Eau de table très gazeuse

Minéralisation totale : 3 gr. 015

Acide carbonique : 4 gr. 764

1° Dilatation gastrique.

2° Arthritisme (lithine et iode).

3° Réminéralisation de l'organisme { Tuberculose (Ferrier). Diabète.

SOURCE NOEL :

Eau de table légère, faiblement minéralisée

Minéralisation totale : 1 gr. 650

Acide carbonique : 1 gr. 9326

1° Catarrhes vésicaux.

2° Albuminuries..... { Digestives. Hépatiques. Lithiasiques.

3° Hypertension par auto-intoxication.

4° Dyspnée des Hypertendus (associée au lactose).

5° Entérite, gastro-entérite.

SALÈNE CIBA

Ether éthyl-méthylglycolique
de l'acide salicylique

Traitement externe des affections rhumatismales et des accès de goutte aiguë.

Applications, badigeonnages, massages, frictions avec le produit pur ou dissous dans l'alcool, l'huile de ricin, l'huile chloroformée, etc.

SALÉNAL

Onguent à 33 1/3 % de Salène pur

Névralgies, Lumbago, Rhumatismes

Tube de 30 gr. : 1 fr. 50

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

SALIT HEYDEN

Ether bornylique de l'acide salicylique

Liquide huileux

Dose et mode d'emploi. — 2 fois par jour une friction avec une demi-cuillerée ou une cuillerée à café de Salit Heyden pur ou mélangé à l'huile d'olive.

Propriétés thérapeutiques. — Antirhumatismal.

Indications. — Rhumatismes musculaires, Névralgies, Rhumatismes articulaires bénins, Synovite tendineuse, Pleurésie rhumatismale, Douleurs dans la lithiase biliaire.

2 fr. le flacon

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard

PARIS (Xe)

SALVARSAN

Produit arsénical N° 606 d'Ehrlich

Avis important. — Le produit livré au commerce sous la marque de *Salvarsan* est reconnu de qualité irréprochable par le Prof. Ehrlich, qui analyse chaque opération au point de vue biologique et chimique, ce produit porte le fac-similé de la signature du Prof. Ehrlich.

Doses. — 0 gr. 01 par kilo, soit 0 gr. 60 en injection intra-veineuse.

Pour atténuer les réactions spécifiques, commencer le traitement par 0 gr. 20 à 0 gr. 30 de *Salvarsan* et n'atteindre la dose normale stérilisante qu'à la 4e injection.

Une seule injection est rarement suffisante pour guérir la syphilis, et le procédé de choix consiste à faire des séries de 4 injections à 8 jours d'intervalle : 0 gr. 30, 0 gr. 40, 0 gr. 50, 0 gr. 60 de *Salvarsan*.

Renouveler éventuellement ces cures de 4 injections jusqu'à disparition des séro-réactions.

Indications. — Spécifique de la Syphilis, des Trypanosomiases, Spirochétoses, Spirilloses, Maladies à protozoaires : Malaria, Fièvre récurrente, Frambœsia, Angine de Vincent, Ulcérations fuso-spirillaires buccales, Ulcérations non spécifiques telles qu'Ulcérations variqueuses, scrofuleuses, Chancre mou. Dans ces dernières affections locales, traitement local avec de la poudre, des pommades ou des collyres à 10 %.

Produits Pharmaceutiques spéciaux CREIL,
de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Laboratoire E. DUPUTEL
CREIL (Oise)

SANTHÉOSE

A base d'une *Diméthylxanthine* irréprochablement pure, associée selon les cas au phosphate de soude, à la caféine ou au benzoate de lithine.

Formes. — Se présente en *cachets en forme de cœur* (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° *Santhéose pure :* Affections cardio-rénales, albuminurie ; 2° *Santhéose phosphatée :* Scléroses, convalescences ; 3° *Santhéose caféinée :* Asthénie, asystolie, infections ; 4° *Santhéose lithinée :* Artério-sclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, antitoxique.

Indications. — Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

5 fr. la boîte

DÉPOT GÉNÉRAL :

4, rue Roi-de-Sicile, PARIS (IVe)

SATUROL

Composition. — Bicarbonate, phosphate et sulfate de soude chimiquement purs (conditions essentielles d'efficacité). (Formule du professeur Bourget, de Lausanne).

Action. — Sature les acides de l'estomac; permet de ramener rapidement, à toutes les périodes de la digestion, l'acidité des hyperchlorhydriques au tarif normal de 0,2 %.

Indications. — Pyrosis (brûlures, acidité, aigreurs, pesanteurs, fermentations, spasmes pyloriques).

Forme pharmaceutique. — Granulé soluble.

Dose. — Une mesure dissoute dans un verre à bordeaux d'eau pure. Répéter aussi souvent que cela est nécessaire.

Laboratoires DURET & RABY

MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

SAUGE BYLA (ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur
inaltérable de la plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche

Dose et mode d'emploi. — 20 à 50 gouttes à prendre avant chacun des 3 principaux repas dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Antisudoral non toxique.

Indications. — Sueurs profuses, Dyspepsies, Entérites.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine

Mode d'emploi et dose. — Injection hypodermique : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique, sédatif du système nerveux.

Indications. — Toutes celles de la Morphine. Ses propriétés antispasmodiques agissent d'une façon remarquable contre la chorée, les tics douloureux, l'Eclampsie puerpérale, etc.

Prix : La boîte de 12 ampoules 4 fr.

L. LECOCQ, Pharmacien de 1re classe
Ancien Interne
Médaille d'or des Hôpitaux de Paris
15, aven. Perrichont, PARIS (XVIe)

SEKTAL GREMY

Ether camphorique du Santalol

Composé synthétique défini dont les éléments constitutifs possèdent une action élective sur les muqueuses vésicale et uréthrale.

Pilules dosées à 0,30 de Sektal par unité

Dose. — 8 à 10 pilules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif, anticatarrhal, bactéricide trois fois plus actif que le santalol ou l'essence de santalol. Tolérance parfaite.

Indications. — Uréthrites blennorrhagiques aiguës ou chroniques. Uréthrites non gonococciennes, Cystites, Catarrhe de la vessie.

P. LONGUET

50, rue des Lombards — PARIS

SÉNOPHILE

Composition et forme. — Cérat astringent, non irritant, non caustique, en tubes compressibles hermétiques, ce qui assure au contenu une asepsie rigoureuse.

Indications. — Erythèmes fessiers des nouveau-nés, Gerçures, Fissures, Crevasses des seins; innocuité absolue.

Mode d'emploi. — Le Sénophile a deux actions différentes : lorsque le mamelon est simplement douloureux, une application matin et soir suffit à faire disparaître la plus légère trace d'inflammation. Lorsque la crevasse ou la gerçure est apparente, c'est après chaque tétée que l'application doit se faire pour produire son maximum d'effet. Avant l'application, laver le mamelon avec de l'eau bouillie tiède et l'essuyer doucement. Le sein sera également essuyé avant chaque tétée.

Références. — Adopté dans les maternités des hôpitaux (Beaujon, Port-Royal, etc.).

Prix. — Le tube : 2 francs

Le demi-tube : 1 fr. 25

Henri FOUCHER ✠, Pharmacien
Ex-Interne médaillé des Hôpitaux de Paris
172, rue d'Alésia — PARIS

SÉQUARDINE BOUTY

Dragées dosées à 1 gr. d'extrait testiculaire

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³.

Dose et mode d'emploi. — Une dragée avant chacun des deux principaux repas ou une injection d'un cm³ par jour.

Indications thérapeutiques. — Faiblesse constitutionnelle.

Prix réglementé :

10 francs la boîte de 50 dragées

6 francs la boîte de 6 ampoules d'un cm³.

Aux médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3 bis, rue de Dunkerque — PARIS

SINAPISME RIGOLLOT

Moutarde en feuilles

Propriétés. — Révulsif, décongestionnant.

Indications. — Congestions cérébrales, Attaque d'apoplexie, Congestion pulmonaire, Bronchite, Fluxion de poitrine, Grippe, Influenza, Névralgies, Choléra, etc...

Mode d'emploi. — Humecter pendant une 1/2 minute dans l'eau froide ou modérément chaude au moment de l'application. On modère l'effet du sinapisme chez les enfants et les personnes sensibles, en interposant une feuille de papier de soie entre la peau et le sinapisme.

Prix : 1 fr. la boîte de 10 feuilles

L. DARRASSE et Cie

13, rue Pavée — PARIS

SIROP D'AUBERGIER

à base de lactucarium d'Auvergne
(Inscrit au Codex
Communication à l'Académie de Médecine)

Propriétés thérapeutiques. — Action *sédative* et *calmante*, sans phase d'excitation, ni aucun des inconvénients de l'opium. — *Eupnéique*, indiqué dans toutes les affections des voies respiratoires. Egalement employé dans l'Insomnie, et tous les cas de Surexcitations du système nerveux.

Convient particulièrement dans la *médecine infantile*.

Forme. — Sirop dosé à 0 gr. 10 de lactucarium et 0 gr. 0012 d'alcaloïde thébaïque par cuillerée à soupe.

Prix : 3 fr. le flacon de 250 cm^3.

Doses. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

PATE D'AUBERGIER

Adjuvant du traitement par le Sirop. — 10 à 12 morceaux par jour.

Prix : la boîte, 1 fr. 50

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

SIROPS HENRY MURE

1º Au bromure de potassium ;
2º Au bromure de sodium;
3º Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
4º Au bromure de strontium (exempt de baryte).

Rigoureusement dosés à 2 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 0,50 cgr. par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable. Se prend pur ou dans 1/4 de verre d'eau, dans une tasse de tilleul ou thé diurétique de France, tiède non sucré.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux.

Indications. — Epilepsie, Hystérie, Névrose, Danse de Saint-Guy, Affections de la moelle épinière, Convulsions, Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue cérébrale, Migraine, Insomnie, Spermatorrhée, etc.

Prix : le flacon, 5 francs

A. GAZAGNE, Pharm. de 1re Classe
à Pont-Saint-Esprit (Gard)
Maison HENRY MURE

SIROP DE PAPAINE BYLA

à base de ferment végétal extrait du caricaya papaya
1 cuillerée à bouche = 0,50 cgr. de papaïne pure

Existe également sous forme d'Elixir

Dose et mode d'emploi. — 1 cuillerée à bouche après chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Analeptique, eupeptique, digestif puissant.

Indications. — Affections de l'estomac : Dyspepsies, Flatulences, Dilatation, etc.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

Les Etablissements BYLA
à Gentilly (Seine)

SOLUROL

(Acide thyminique pur)

Propriétés thérapeutiques. — Eliminateur physiologique de l'acide urique. Traitement de la diathèse urique sous toutes ses formes.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 25. Prix : le flac. de 25 comprimés, 3 fr. 50

Doses et mode d'emploi. — Crises aiguës : 5 à 7 comprimés par jour. Cures périodiques : 3 à 4 comprimés par jour. Écraser les comprimés pour les avaler.

Remarque. — Le Solurol doit faire l'objet de cures périodiques chez tous les malades qui ont à redouter le retour d'accidents uriques. Ces cures devront de préférence avoir lieu au printemps et à l'automne surtout chez les goutteux. Elles dureront chaque fois 3 à 4 semaines, au minimum.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SOLUTIONS DU Dr CLIN

1° Au Salicylate de Soude
2° Au Salicylate de Lithine
3° A l'Antipyrine

Avantages. — Pureté et tolérance garanties.

Formes et doses. — 1° Solution du Dr Clin au Salicylate de Soude dosée à 2 gr. par cuillerée à soupe.

Prix : le flacon de 300 cm^3, 6 fr.

2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

2° Solution du Dr Clin au Salicylate de lithine, dosée à 1 gr. par cuillerée à soupe.

Prix : le flacon de 300 cm^3, 6 fr.

1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

3° Solution d'Antipyrine du Dr Clin, dosée à 1 gr. par cuillerée à soupe.

Prix : le flacon de 250 cm^3, 6 fr.;
le flacon de 150 cm^3, 3 fr. 50.

1 à 3 cuillerées par jour.

Remarque. — Grâce à leur véhicule spécial, les solutions du Dr Clin assurent la tolérance et la diffusion du médicament et se sont acquises à ce point de vue, une réputation bien connue.

Laboratoires CLIN
20, rue des Fossés-Saint-Jacques
PARIS

SPHÉRULINES CHOLAGOGUES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,10 cgr. d'Extrait de bile par unité.

Doses et mode d'emploi. Indications. — 1° *Chez les lithiasiques ou chez les malades prédisposés à la lithiase biliaire :* 2 Sphérulines par jour, 1 à chacun des 2 principaux repas. Cette médication doit être prolongée.

2° *Contre le retour des coliques hépatiques :* 2 Sphérulines par jour, comme ci-dessus, continuer plusieurs mois de suite et reprendre par cures intermittentes de quelques semaines.

3° *Dans les cas d'ictère par rétention :* 5 à 6 Sphérulines par jour.

Prix réglementé : le flacon, 4 fr.

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49

à BOULOGNE (Seine)

SPHÉRULINES ENTÉRIQUES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,30 cgr. d'Extrait par unité.

Dose. — 2 à 6 Sphérulines par jour à la fin des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Favorise la sécrétion du pancréas, augmente la puissance digestive et la quantité du suc pancréatique.

SPHÉRULINES ENTÉRO-PANCRÉATIQUES MONCOUR

Sucs pancréatique et intestinal associés

Sphérulines dosées à 0,25 cgr. d'Extrait par unité.

Dose. — 1 à 4 Sphérulines au début de chaque grand repas.

Prix réglementé : le flacon, 6 francs

A. de MONTCOURT

49. avenue Victor-Hugo, 49

à BOULOGNE (Seine)

SPHÉRULINES GASTRIQUES MONCOUR

(Opothérapie)

1 gr. d'Extrait = 50 cm³ de suc gastrique normal de l'homme

Sphérulines dosées à 0 gr.125 d'Extrait par unité.

Dose et mode d'emploi. — De 4 à 16 Sphérulines par jour à prendre au milieu des repas.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'hypopepsie, qu'il y ait hyperchlorhydrie, *chlorhydrie normale ou hypochlorhydrie.* Dans ce dernier cas, on administre simultanément l'Extrait gastrique et un médicament acide.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49

à BOULOGNE (Seine)

SPHÉRULINES
HÉPATIQUES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,30 cgr. par unité.
Extrait en doses massives de 12 gr.
Suppositoires dosés à 3 gr. par unité.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 16 Sphérulines avant les repas. Dans les cas graves, doses massives de 12 grammes d'extrait par jour, en une seule fois, délayées dans du lait ou du bouillon *(Gilbert)*. En cas d'intolérance de l'estomac on recourra aux suppositoires : 1 à 4 par jour à prendre une heure avant les repas, en demeurant allongé jusqu'au repas.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'insuffisance hépatique : Cirrhoses, Hémorragies et Hémoptysies des tuberculeux, Tuberculose au début, Ictère grave, Diabète, Héméralopie.

Prix réglementés :
6 fr. le flacon de Sphérulines.
18 fr. la boîte de 12 doses d'Extrait.
10 fr. la 1/2 boîte 6 — —
8 fr. la boîte de Suppositoires.

A. de MONTCOURT
49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

S

SPHÉRULINES OVARIENNES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,20 cgr. de poudre ovarienne par unité.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 Sphérulines par jour; débuter par 1 par jour à prendre avant le repas de midi.

Indications thérapeutiques. — Ménopause, Castration à la suite d'opérations chirurgicales, Arrêt de développement et insuffisance des ovaires, Chlorose, Neurasthénie féminine. La médication ovarienne doit être suivie longtemps; elle est facilement supportée et n'amène pas d'intolérance. Il est bon, pour éviter l'accoutumance, d'observer des périodes de repos pendant la durée du traitement et de faire varier les doses.

Contre-indication. — Grossesse.

Prix réglementé : le flacon, 6 francs

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49

à BOULOGNE (Seine)

SPHÉRULINES RÉNALES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,15 cgr. d'Extrait par unité.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 16 Sphérulines par jour avant les repas. En cas de traitement prolongé observer un repos de 4 ou 5 jours tous les 10 jours.

Propriétés thérapeutiques. — L'extrait rénal augmente la sécrétion de l'urine, l'excrétion des sels urinaires, des produits de désassimilation et des toxines.

Indications. — Néphrites interstitielles parenchymateuses, diffuses; albuminurie; urémie par imperméabilité rénale.

Prix réglementé : le flacon, 6 francs

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

S

SPLÉNINE BYLA

(Glande splénique)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,15 cgr.).

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Impaludisme, Anémie toxique et Rachitisme.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

STRONAL

Lactate de Strontiane chimiquement pur et arrhénal

Indications. — Albuminurie (sans régime). Toutes maladies ayant pour cause le ralentissement de la nutrition : Diabète, Dilatation d'estomac, Entérites chroniques, Dysenterie, Anémie, Dysménorrhée anémique.

Dose (Comprimés). — Albuminurie, trois par jour. Augmenter de un tous les trois jours jusqu'à six. Pour les autres affections, trois à quatre par jour pendant 15 jours.

G. MONNIER

Pharmacien de 1re Classe
10, rue de la Pépinière, PARIS

STYPTICINE-MERCK

Chlorhydrate de Cotarnine, dérivé de la Narcotine, de composition très voisine de celle de l'Hydrastinine.

Caractères. — Poudre amorphe, jaunâtre, facilement soluble dans l'eau (solutions stérilisables).

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique général et local, sédatif utérin, antiseptique, antiphlogistique. *Toxicité absolument nulle.*

Indications. — Toutes les Hémorragies de l'appareil utéro-ovarien, Symptômes douloureux des affections utéro-ovariennes, Hémorragies locales (rhino-laryngologie, odontologie, etc.), Hémophilie, Hémoptysies.

Dose et mode d'emploi. — Par jour, 0 gr. 25 à 0 gr. 40 et plus, à l'intérieur, de préférence en tablettes (commencer par 0 gr. 15 à 0 gr. 20 quelques jours avant les époques menstruelles.

Tablettes de Stypticine-Merck, dosées à 0 gr. 05. — Prix : 2 fr. 50

Stypticine-Merck, en flacons d'origine de 1,5 et 10 gr.

Pharmacie du Dr BOUSQUET

Licencié ès-sciences
140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

SULFOLÉINE ROZET

Extrait du Sulfolitholate
d'ammonium
$C^{56}H^{36}S^{6} (AzH^{4})^{4} O^{12}$

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 3 mois, 2 cuillerées à café par jour; de 3 mois à 3 ans, 2 à 4 cuillerées à café par jour; de 3 à 15 ans, 2 à 4 cuillerées à dessert; de 15 ans et au-dessus, 2 à 3 cuillerées à soupe, de préférence avant les repas, après une quinte, pure ou dans tel liquide qui plaira au malade : lait, tisane, etc., etc...

Propriétés. — Spécifique de la Coqueluche. (La *Sulfoléine Rozet* est la seule préparation préconisée contre la Coqueluche qui soit annoncée exclusivement aux médecins).

Prix réglementé : le flacon, 4 fr. 50
Pour MM. les Médecins : 3 fr. 50 franco

Laboratoire FREYSSINGE
6, rue Abel, PARIS

SULFOQUINOLINE SAUTER

Tablettes d'Orthooxyquinolinsulfate

Désinfectant remplaçant le sublimé, l'oxycyanure de mercure, l'acide phénique, l'iodoforme, etc...

Non toxique, innocuité parfaite. Action microbicide supérieure à celle de l'acide phénique et à celle du sublimé.

Mode d'emploi. — En solution, 1 pastille par litre d'eau pour lavages des plaies, ulcérations, gargarismes, collutoires, dentifrices, etc... Les lavages à la Sulfoquinoline guérissent et empêchent l'excoriation des petits enfants, la croûte de lait, etc...

S'emploie à l'intérieur sous forme de pilules kératinisées contre les maladies infectieuses des intestins.

Prix suivant dose : 1 fr., 1 fr. 50, 2 fr.

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

SUPPOSITOIRES D'EUPROCTOL

Antihémorroïdaux Sauter

Aux iodo-résorcinosulfonate de bismuth (Euproctol), Oxyde de zinc, Baume du Pérou, Beurre de Cacao.

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir avant de se coucher. Au besoin on peut également en employer un le matin mais en restant couché au moins une demi-heure après l'application. Si le pourtour de l'anus est affecté, enduire cette partie avec un morceau de suppositoire écrasé entre les doigts.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfectants et émollients. Guérissent rapidement les irritations et inflammations des muqueuses de l'intestin tout en agissant comme astringents sur les dilatations de celui-ci qu'ils ramènent à l'état normal. Facilitent les selles.

Indications. — Toutes Hémorroïdes tant fluentes que sèches et suppurantes.

Prix : la boîte de 12, 3 francs

Laboratoires SAUTER
49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adréno-Styptiques)

Adrénaline	1/4 mgr.
Anesthésine-stovaïnée........	0,06 cgr.
Excipient antihémorroïdaire..	Q. S.
(Tannin, Hamamelis, Opium).	

pour un suppositoire

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes, soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des Hémorroïdes.

La même formule existe sous forme de

POMMADE ADRENO-STYPTIQUE MIDY

contenue dans un tube d'étain, sur lequel s'adapte une petite canule en ébonite.

Prix réglementé : la boîte, 4 francs

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS (VIIe)

SUPRARÉNINE SYNTHÉTIQUE " CREIL "

Ortho dioxyphényléthanolméthylamine gauche

Adrénaline chimiquement pure obtenue par synthèse chimique

Comprimés dosés à 1 milligramme.
Solutions aqueuse et huileuse au 1/1000e en ampoules et en flacons.
Solutions et Comprimés de Novocaïne-Suprarénine " Creil " pour Anesthésies locales, régionales et lombaires.
Solutions aqueuse et huileuse de Novocaïne-Suprarénine " Creil " très efficaces surtout dans le Rhume des foins et le Coryza.

Propriétés thérapeutiques.—Vaso-constricteur, ischémique, hémostatique, toni-cardiaque, renforçant la systole du cœur.

Indications. — Anémie des champs opératoires, pour renforcer et localiser l'action des anesthésiques, pour amener, par badigeonnage, un afflux réactionnel de sang dans les régions malades. Le plus puissant des hémostatiques externes par badigeonnage, et internes par ingestions et injections sous-cutanées, intra-veineuses et intra-artérielles.

Produits pharmaceutiques spéciaux " CREIL " de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline.
19, rue du Faubourg Poissonnière
PARIS (IXe)

Pharmacien : Laboratoire E. DUPUTEL
à CREIL (Oise)

SURRÉNALINE BOUTY

Dragées dosées à 0,10 cgr. de Capsule surrénale desséchée correspondant à 0,80 cgr. de Capsules surrénales.

Ampoules de 1 cm^3 et de 3 cm^3.

Dose et mode d'emploi. — 1 dragée avant chacun des deux principaux repas ou une injection d'un cm^3 par jour.

Indications thérapeutiques. — Maladies de Basedow et d'Addison.

Prix réglementé :

10 fr. la boîte de 50 dragées
6 fr. la boîte de 6 ampoules 1 cm^3

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3bis, rue de Dunkerque, PARIS

SURRÉNINE BYLA

Glande surrénale

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux soluble seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 9 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Insuffisance rénale, Néphrites aiguës ou chroniques, Accidents de l'urémie et de l'albuminurie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base d'oxygène naissant, menthol, coca-stovaïne, benzoate de soude, etc...

Tablettes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes*, 10 à 15 par jour à sucer ; *Enfants*, 6 à 10 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Grippes, Pharyngites, Laryngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Prix réglementé : 1 fr. 75 la boîte

Pharmacie PERRAUDIN

70, rue Legendre, PARIS (XVIIe)

TAMAR INDIEN GRILLON

Bonbon chocolaté, très agréable à prendre

Propriétés. — Laxatif entièrement végétal, n'irrite jamais l'intestin et l'emploi journalier n'en diminue pas l'efficacité.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique et intestinal.

Dose et mode d'emploi. — Un bonbon ou un demi-bonbon suivant le tempérament; se prend sans rien changer à ses habitudes.

TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée, 13 — PARIS

TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le TAMPOL " ROCHE " est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant six secondes environ le TAMPOL " ROCHE " dans l'eau bouillie à peine tiède, puis la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement, jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait.*

N.-B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du TAMPOL " ROCHE " d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Prix réglementé :

6 fr. la boîte de 6 Tampol " Roche "

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cº

21, place des Vosges, 21 — PARIS

TANNISMUT HEYDEN

Bitannate de bismuth

Comprimés dosés à 0,50 cgr. et poudre

Doses et mode d'emploi. — En une fois. — *Enfants :* 0 gr. 1 à 0 gr. 3. — *Adultes :* 0 gr. 3 à 0 gr. 6. Dose journalière, jusqu'au sextuple de la dose unique.

Propriétés thérapeutiques. — Astringent intestinal.

Indications. — Diarrhées aiguës et chroniques chez les enfants et les adultes.

1 flacon *Tannismut Heyden :* 1 franc

1 tube 20 comprimés *Tannismut Heyden :* 1 fr. 25

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^e)

TANNOFORME-MERCK

Produit de condensation
du gallotannin et de la formaldéhyde

Caractères. — Poudre légère, blanc rougeâtre, presque insipide, inodore, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'alcool ou un mélange d'alcool et d'éther (jusqu'à 10 %).

Propriétés thérapeutiques. — Astringent, antidiarrhéique (ne se dédouble que dans l'intestin), antiseptique, cicatrisant, anhydrotique.

Indications. — A l'intérieur : Entérites aiguës et chroniques; à l'extérieur : Plaies simples ou suppurées, Intertrigo, Hyperidrose.

Doses et mode d'emploi. — Par jour, 3 ou 4 paquets de 0 gr. 15 à 0 gr. 75 (enfants, suivant l'âge); de 1 gr. à 1 gr. 50 (adultes); en poudre, pur ou mêlé à du talc (1 pour 5 ou 10), pour saupoudrer; en pommades à 10 %. — Mêmes emplois, à doses appropriées, en médecine vétérinaire (voir notice spéciale).

Tannoforme-Merck
en boîtes d'origine de 25 et de 100 gr.

Pharmacie du Docteur BOUSQUET
Licencié ès-Sciences
140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas. (Spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 3 fr. 50 la boîte, sous n'importe quelle forme

Laboratoire DURET & RABY

MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

THIOCOL " ROCHE "

Dérivé du Gaïacol, inodore, ni toxique ni caustique, soluble dans l'eau

1 gr. de THIOCOL "ROCHE" = 0 gr. 52 de Gaïacol cristallisé

Doses et mode d'emploi. — *Enfants*, 0 gr. 50 à 2 gr. selon l'âge; *Adultes*, jusqu'à 6 gr. par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Indications thérapeutiques. — Toutes les Affections Broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc...

Sirop " Roche " au Thiocol, 2 à 4 cuillerées par jour et plus. Prix : 4 fr. 1 cuillerée à soupe de Sirop " Roche " = 1 gr. de Thiocol " Roche ".

Comprimés de Thiocol " Roche ", 2 à 8 par jour et plus. Prix : 2 francs. 1 comprimé de Thiocol " Roche " = 0 gr. 50 de Thiocol " Roche ".

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cº

21, place des Vosges, PARIS (IVe)

THYRATOXINE BYLA

Thyroïdine non toxique sans action sur le cœur

Comprimés dosés à 0.025 de substance active.

1 comprimé = 12 cgr. 5 de glande fraîche.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : Commencer par une pastille par jour, augmenter d'une unité au bout de 4 jours, et ainsi de suite pour arriver à 4 pastilles par jour le treizième jour; continuer cette dose jusqu'au vingtième ou trentième jour.

Enfants : 1/2 pastille ou une entière par jour pendant 15 jours, on peut augmenter ensuite d'une unité. Surveiller et continuer le traitement pendant fort longtemps.

Propriétés thérapeutiques. — Préparation thyroïdienne la plus riche en iode qui existe, la plus pauvre en toxines : choline, méthylamines, alcaloïdes toxiques, leucomaïnes, etc. Sans parathyroïdes externes.

Indications. — Traitement rationnel et inoffensif de l'obésité et de tous les états thyroïdiens.

Prix réglementé :
Le flacon de 80 pastilles, 8 francs

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

THYROIDINE BOUTY

Glandothyrine

Dragées dosées à 0,10 cgr. de glande desséchée correspondant à 0,70 cgr. de glandes fraîches.

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³.

Doses et mode d'emploi. — 2 dragées le matin à jeun ou une injection d'un cm³ par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Modifie profondément les échanges nutritifs. Accroît l'élimination de l'azote et de l'urée par les urines.

Indications. — Obésité, Myxœdème, Goître, Psoriasis, Fibromes, etc.

Prix réglementé :
La boîte de 50 dragées, 10 francs
La boîte de 6 ampoules 1 cm³, 6 fr.
Escompte aux médecins : 50 %

Laboratoires BOUTY
3bis, rue de Dunkerque, PARIS

THYROIDINE BYLA

Glande thyroïde

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,05 cgr.).

Dose moyenne. — 2 à 4 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Myxœdème et infantilisme, Obésité, Arrêt de croissance, Fibromes.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique

Ampoules contenant chacune : Eau de mer isotonique 5 cm³; Cacodylate de soude 0,05 cgr.; Glycérophosphate de soude 0,20 cgr.; Sulfate de strychnine 1 mgr.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoute l'action des 3 médicaments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — Tuberculose, Neurasthénie, Entérites. Les *déprimés* par surmenage intellectuel, les convalescents de maladies infectieuses (Grippe, Paludisme) sont justiciables de ce neuro-tonique.

Prix réglementé :

La boîte de 12 ampoules, 9 francs
6 ampoules, 5 francs

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE
24, rue Caumartin, PARIS

TRICALCINE

à base de sels calciques rendus assimilables

Doses et mode d'emploi. — *Une mesure à chacun des trois repas.* — Ajouter le contenu de la cuillère-mesure aux aliments, dans le cours du repas. Observer exactement cette dose pour les adultes. Pour les enfants au-dessous de 10 ans, 1/2 dose.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme.

Indications. — Tuberculose, Lymphatisme, Scrofulose, Rachitisme, Anémie, Dyspepsie nerveuse, Diabète, etc...

Le flacon, 4 fr. 50
(30 jours de traitement)
(Prix réglementé. — Ticket-prime de 0 fr. 90).

Laboratoire des Produits Scientia
42, rue Blanche, PARIS (IXe)

TRIGÉMINE " CREIL "

Combinaison de Pyramidon et d'Hydrate de Butylchloral
Spécifique de la douleur

Capsules dosées à 0,25 cgr. (boîtes de 5 et 10 capsules).

Dose et mode d'emploi. — Névralgies légères, 0,25 cgr.; aiguës, 0,50 cgr.; faciales, sciatiques, etc., 0,75 cgr., tabétiques et chroniques, jusqu'à 1 gr. 50 dans un peu d'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et sédative, pas d'accumulation ni d'accoutumance. — Somnifère.

Indications. — Toutes les Névralgies des nerfs crâniens surtout, Maux de dents, Névralgies intercostales, sciatiques, rhumatismales, pleurétiques, dysménorrhétiques et menstruelles, Douleurs post-opératoires.

Produits pharmaceutiques spéciaux " CREIL " de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline.

9, rue du Faubourg Poissonnière
PARIS (IXe)

Pharmacien : **Laboratoire E. DUPUTEL**
à CREIL (Oise)

TRINITRINE " VICARIO "

En petits comprimés d'une désagrégation rapide et complète, d'une assimilation certaine contenant 1, 2 et 3 gouttes de la solution alcoolique au centième.

Trinitrine Vicario. — No 1 (à une goutte), le flacon, 3 francs; No 2 (à deux gouttes), le flacon, 3 fr. 50; No 3 (à trois gouttes), le flacon, 4 francs.

Dose. — De 2 à 6 gouttes par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament vaso-dilatateur et hypotenseur. Exerce sur le système nerveux une action analogue à celle du nitrite d'amyle, moins violente et plus durable.

Indications. — Aortite, Angine de poitrine, Presclérose, Artério-sclérose, Anémie cérébrale, Céphalalgies, Asthme, Maladie de Stokes-Adams, etc...

Pour éviter toute confusion, *prescrire Trinitrine " VICARIO ".*

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann, PARIS

T

TRIXYL FRAUDIN

1 comprimé = 0,55 cgr.
Arshémonucléatine triphosphatée

Doses et mode d'emploi. — *Enfants,* 1/2 à 1 comprimé avant chaque repas. — *Adultes,* 2 à 3 comprimés avant chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotrophique, hématogène. Reminéralisateur *immédiatement actif.*

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où l'organisme est en état d'infériorité : Anémies et Asthénies de toute nature, Chlorose, Prétuberculose, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence de maladies infectieuses, Surmenage, Neurasthénie, Déchéances organiques, etc., etc...

Trixyl Fraudin, la boîte 60 comprimés, 4 fr. (spécialité réglementée)

Laboratoire du CHARBON FRAUDIN
BOULOGNE (près Paris)

ULMARÈNE

Mélange d'éther salicylique d'alcools à poids moléculaires élevés contenant 75 % d'acide salicylique.

Forme. — Liquide lourd, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et les huiles en toutes proportions. Produit français, d'odeur faible, non désagréable, non toxique et non irritant. En flacons de 30, 60 et 125 gr.

Autres formes. — Baume du Dr Gigon à l'*Ulmarène*; Liniment *Ulmarol* du Dr Gigon.

Indications. — Traitement local du Rhumatisme sous toutes ses formes. Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, chronique, déformant; Arthrite sèche, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Zona, Migraines.

Dose et mode d'emploi. — S'emploie en badigeonnages à la dose de 3 à 20 gr. par jour. Recouvrir de ouate et de taffetas gommé. Peut être associé à une pommade, à un liniment, etc...

A. GIGON & Dr André GIGON

Pharmaciens

7, rue Coq-Héron, PARIS

URASEPTINE ROGIER

A base de Pipérazine, d'Urotropine, d'Helmitol, de Benzoates de soude et de Lithine.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 60 de substance active par cuillerée à café.

Dose. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, deux heures au moins avant ou après les repas.

Propriétés. — Antiseptique urinaire par excellence. Diathèse urique. Arthritisme.

Le flacon, 5 francs

Henry ROGIER, Pharm. de 1re Classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
3 et 5, boul. de Courcelles,
PARIS (VIIIe)
Téléphone 533.70

URISANINE

Solution de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine en excipient à base végétale

Sel de constitution définie. Combinaison d'une molécule d'acide benzoïque pur du benjoin avec deux molécules d'hexaméthylène - tétramine (urotropine). L'excipient renferme en grande quantité le principe de plantes balsamiques, auquel a été incorporé l'extrait pur de stigmates de maïs. Une cuillerée à soupe d'Urisanine renferme 1 gramme de Benzoate d'urotropine et 0,20 cgr. d'extrait de stigmates de maïs, dissous dans 14 grammes d'excipient végétal.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique complet des voies urinaires, balsamique et diurétique, dissolvant urique et phosphatique.

Indications. — Toutes les Affections des voies urinaires et rénales, Incontinence essentielle Diathèse urique, Maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe, etc.), Fermentations et putréfactions intestinales.

Doses et mode d'emploi. — Se prend pure ou diluée dans l'eau ordinaire ou gazeuse. *Adultes*, 2 à 4 cuillerées à soupe par jour; *Enfants*, par cuillerée à café ou à dessert, selon l'âge.

Prix réglementé : le flacon, 4 fr. 50

G. COUSSINET, Pharmacien
20, rue des Martyrs, PARIS

UROTROPINE SCHERING

(Nom déposé)

Comprimés et Cachets dosés à 0 gr. 50 par unité.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 gr. par jour en plusieurs prises.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus puissant antiseptique des voies urinaires. Diurétique.

Indications. — Phosphaturie, Fermentations ammoniacales, Dépôts uriques, Coliques néphrétiques, Bactériurie, Pyélite, Cystite aiguë et chronique, Voies biliaires.

Le flacon de 25 comprimés, 1 fr. 75
La boîte de 20 cachets, 3 francs

Pharmacie RATIONNELLE
4, faubourg Poissonnière, PARIS

VALÉRAL PUY

Bromovalérianate sodique, alcalin

Succédané plus actif des valérianates et des bromures. Tolérance absolue. Odeur et saveur agréables. Action fidèle et soutenue. Pas d'accoutumance.

1º *Solution* concentrée non sucrée, dosée à 0 gr. 50 de Bromo-Valérianate sodique alcalin (Valéral) par cuillerée à café à prendre délayée dans un peu d'eau sucrée ou non.

2º *Capsules* à enveloppe soluble de gluten, dosées à 0 gr. 25 de Valéral.

Doses et indications. — Névroses convulsives, spasmodiques, douloureuses, Insomnies, Crampes, Cauchemars : 1 à 2 cuillerées à café en se couchant ; Spasmes, Douleurs, Coliques hépatiques ou néphrétiques : 1 à 2 cuillerées à café pendant l'accès ; Névroses chroniques, Chorée : 3 cuillerées à café entre les repas.

Laboratoire J. PUY

à GRENOBLE

VALÉRIANE BYLA

(ÉNERGÉTÈNE DE)

36 gouttes = 1 gramme de la plante fraîche

Suc pur inaltérable de la plante fraîche

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café dans la soirée à prendre dans un peu d'eau sucrée. Répéter l'administration au moment des crises.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif régulateur du système nerveux, non toxique, facile à administrer, d'odeur agréable.

Indications. — Névroses, Hystérie, Epilepsie, Insomnies nerveuses, Névralgies, Neurasthénie, Migraines, Troubles de la Ménopause, Convulsions des enfants, Tics, Chorée, Palpitations, Tachycardie, Diabète.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

VALÉRIANE

(Extrait fluide Dausse)

Extrait fluide à poids égal de Valériane fraîche stabilisée

Propriétés pharmacologiques. — En raison de la stabilisation de la plante fraîche, l'extrait fluide préparé suivant ces conditions conserve l'activité médicamenteuse de la plante sans altération. Constance et égalité d'effet médicamenteux. Non toxique, sans odeur. Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Indications. — Excitation nerveuse, Insomnies nerveuses, Chorée, Névroses, Neurasthénie, Migraines, Névralgies, Dysménorrhée, Douleurs cataméniales, Troubles de la Ménopause, Palpitations, etc.

Posologie. — Dose moyenne, 2 à 3 cuillerées à café par jour. Dose maxima, 5 cuillerées à café par jour.

Laboratoire pharmaceutique
DAUSSE Aîné
4, rue Aubriot, PARIS

VALÉRIANE (Intrait de)

Extrait physiologique de Valériane stabilisée

Propriétés thérapeutiques. — L'Intrait de Valériane, par suite de la stabilisation de la plante fraîche, conserve intacts les complexes existant dans la plante naturelle. L'Intrait de Valériane diffère de toutes les autres préparations de Valériane par ses effets constants et sûrs. De toxicité nulle, il est *dépourvu de toute odeur*. Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Indications. — Excitations nerveuses, Insomnies nerveuses, Chorée, Névroses, Neurasthénie, Migraines, Névralgies, Dysménorrhée, Douleurs cataméniales, Troubles de la Ménopause, Palpitations, etc...

Posologie. — Dose moyenne : 0 gr. 20 à 0 gr. 30 par jour. Dose maxima : 0 gr. 50 par jour.

Préparations d'Intrait de Valériane. — Pilules à 0 gr. 05, 4 à 6 pilules par jour. Dose maxima : 12 pilules.

Solution d'Intrait de Valériane. — Une cuillerée à café renferme 0 gr. 10 d'Intrait. Dose moyenne : 2 ou 3 cuillerées à café. Dose maxima : 6 cuillerées à café par jour.

VALÉROBROMINE LEGRAND

Liquide : Dosé à 0,50 cgr. de bromovalérianate de soude par cuillerée à café.

Capsules enrobées de gluten : Dosées à 0,25 cgr. de bromovalérianate de magnésie par capsule.

Propriétés. — Sédatif anti-nerveux. Exerce une action énergique sur les centres nerveux. Diminue et abolit leur excitabilité réflexe.

Indications. — Toutes les indications du brome avec plus d'activité et sans avoir les inconvénients.

Doses. — *Liquide :* 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée. *Capsules :* 4 à 12 capsules par jour.

DARRASSE Frères
13, rue Pavée, PARIS

VALS

Eaux Minérales Naturelles
de la Société
des Grandes Sources de Vals

Le Groupe des " *Grandes Sources de Vals* " comporte 13 sources graduées, bicarbonatées sodiques, ferro-magnésiennes, lithinées, très gazeuses.

Permettent la Cure à la station ou à domicile.

Les principales de ces sources sont les suivantes :

Croix-Rouge, Croix-Bleue, Saint-Jacques, Normale, Gallia, Mady, Sapho, Union

Les 2 premières sont vendues exclusivement par les pharmaciens.

Indications générales. – Maladies des enfants, Diarrhée infantile, Estomac, Gastralgie, Dyspepsie, Intestins, Vessie, Foie, Diabète, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Albuminurie, etc...

Société des Grandes Sources de VALS
à VALS-LES-BAINS (Ardèche)

VALYL MIDY

A base de " Valyl Creil " ou Valérianamide Diéthylé chimiquement pur.

$$\genfrac{}{}{0pt}{}{CH^3}{CH^3}{>}CH-CH^2-COA_2{<}\genfrac{}{}{0pt}{}{{}^2H^5}{C^2H^5}$$

Capsules dont chacune renferme 0,05 cgr. de Valyl.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 6 à 12 capsules par jour.

Enfants : 3 à 9 capsules par jour et plus dans les états nerveux graves. — Les prendre de préférence aux trois principaux repas.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique.

Indications. — Toutes celles des préparations de Valériane.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

VARICURE MARCK
POMMADE VARICURE MARCK

Composition. — Purpuro-érythrate alcalin associé aux tannoïdes naturels (acide kramérique, etc.).

Formes. — Comprimés. — Pommade N° 1, Pommade N° 2 pour applications. Suppositoires.

Indications thérapeutiques. — Varices, Phlébites, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Varicocèles, Maladies des os, Troubles de la ménopause, Acné, Taches et dépôts sanguins sous-cutanés, Eczémas etc.

Mode d'emploi. — Comprimés : Croquer 6 comprimés par jour en trois fois avant les repas et prendre un demi-verre d'eau ou de tilleul ; suivre le traitement pendant trois jours, cesser 8 jours et reprendre. — Pommade N° 1. Varices, Phlébites, Taches. Pommade N° 2, Plaies et Ulcères variqueux, Affections de la peau. Suppositoires, Hémorroïdes.

Les pommades 1 ou 2 (suivant indications) et les suppositoires sont l'adjuvant indispensable du traitement interne par le décocté de *Varicure Marck*.

L'emploi de la pommade
et des suppositoires doit être journalier.

G. MONNIER
Pharmacien de 1re Classe
10, rue de la Pépinière, PARIS

V

VARILAXINE

Groupe **cinq laxatifs différents** mais d'action équivalente

Chaque boîte renferme 5 Tubes, numérotés de 1 à 5.

Le Tube nº 1 contient : 10 Comprimés dosés à 0,40 de Rhubarbe active.
Le Tube nº 2 contient : 10 Comprimés dosés à 0,40 de Cascara évacuant.
Le Tube nº 3 contient : 10 Comprimés dosés à 0,03 de Podophyllin.
Le Tube nº 4 contient : 10 Comprimés dosés à 0,28 d'Extrait sec de Rhamnus.
Le Tube nº 5 contient : 10 Comprimés dosés à 0,33 d'Extrait de Tamarin.

L'Agar-Agar forme l'excipient de tous les comprimés

Dose et Mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, un ou deux Comprimés avant le repas du soir en alternant du nº 1 au nº 5, pour reprendre au nº 1 le 6e jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative toujours identique — Jamais d'accoutumance ni d'irritation intestinale — Tolérance parfaite — Innocuité absolue. — Pas de constipation consécutive.

Prix réglementé :
La boîte de 50 Comprimés, 4 francs

Laboratoire de la VARILAXINE
164, rue Saint-Honoré, PARIS

V

VÉRITABLES GRAINS DE SANTÉ DU Dr FRANCK

Aloès et Gomme Gutte

Codex : Edit. 1866; Formule no 603

Contre la Constipation, le Manque d'appétit, la Migraine, les Embarras gastriques, la Dyspepsie, les Vertiges, etc. — Ils sont le préservatif des Attaques d'apoplexie.

Dose et mode d'emploi. — Comme apéritifs et stomachiques : en prendre un au commencement du repas pendant plusieurs jours; comme dépuratifs, purgatifs et antiseptiques : suivant le tempérament en prendre 1, 2, 3 ou 4 à jeun ou *immédiatement avant de manger*, dans un peu d'eau ou dans la première cuillerée de potage.

Prix : la boîte, 3 fr.; la 1/2 boîte, 1 fr. 50

T. LEROY

96, rue d'Amsterdam, PARIS (VIIIe)

ANALGÉSIQUES EXTERNES
ANESTHÉSIQUES

Adrénaline Byla.
Adrénaline Clin.
Baume Delacour.
Bétul-Ol Midy.
Cocaïne Midy.
Novocaïne Creil.
Rhésal Vicario.
Salène Ciba.
Salit Heyden.
Sinapisme Rigollot.
Stovaïne.
Suprarénine synthétique Creil.
Stypticine-Merck.
Ulmarène du Dr Gigon.
Ulmarène du Dr Gigon (Produits à l').



ANALGÉSIQUES INTERNES
CALMANTS
ANTINÉVRALGIQUES

Acide Acétosalicylique Heyden.
Ampoules de Pantopon Roche.
Antialgos Christiaens.
Antigrippine Midy.
Antodyne.
Aspirine Vicario.
Bibromure Vicario.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cachets Cépé.
Cérébrine.
Cérébrine Byla.
Cétrarose du Dr Gigon.
Dionine Merck.
Dionine-Merck (Sirop et Tablettes du Dr Bousquet).
Héroïne Vicario.
Mélubrine.
Narcyl Grémy.
Neurène.
Névraltéine Rogier.
Pantopon Roche.
Pilules de Moussette.
Pyramidon Creil.
Sirops Henry Mure.
Solutions du Dr Clin.
Solutions Henry Mure.
Suppositoires Adréno-styptiques Midy.
Tribromure de A. Gigon.
Trigémine Creil.
Valéral Puy.
Valériane Byla.
Valériane (Extrait fluide Dausse).
Valériane (Intrait Dausse).
Valérianose du Dr Gigon.
Valérobromine Legrand.
Valyl-Midy.
Véronal.

ANÉMIE
(SCROFULES-LYMPHATISME-RACHITISME)

Algarine Nyrdhal.
Ampoules Churchill Indolores.
Bi-Iodures Souffron.
Biophorine Girard.
Capsules de Morrhuine Puy.
Comprimés de Thiocol Roche.
Dragées de F. Gille.
Electromartiol
Elixir de Propeptonefer Byla.
Engelurol.
Fer Rabuteau.
Feroxal.
Fortossan Ciba.
Glycérophosphate Robin.
Gouttes de Propeptonefer Byla.
Hématol.
Hémoglobine Byla.
Hémostyl.
Hippoplasine Gran.
Hypophosphites Churchill.
Iode (Moride Nyrdahl).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Kineurine Moncour.
Lécithine Clin.
Lipochol Byla.
Lymphatine Byla.
Métharfer Bouty.
Métharsol Bouty.
Méthylarsinate Vicario.
Morrhuëtine Juncken.
Musculosine Byla.
Néobione Sauter.
Nucléofer Girard.
Panutrine Sauter.
Pepto-Fer du Dr Jaillet.
Peptonate de Fer Robin.
Peptone Byla.
Phosféryl Fournier.
Phytine Ciba.
Sirop de F. Gille.
Sirop d'Hémoglobine Byla.
Sirop Roche au Thiocol.
Toni-Lécithine Rogier.
Tricalcine.
Vin Girard.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry.

ANTIPYRÉTIQUES

Acide Acétosalicylique Heyden.
Antigrippine Midy.
Aspirine Vicario,
Cachets Cépé.
Kineurine Moncour.
Néoquinine Falières.
Névraltéine Rogier.
Pantopon Roche.
Phytinate de Quinine Ciba.
Pyramidon Creil.
Salit Heyden.

ANTISEPTIQUES EXTERNES DÉSINFECTANTS

Airol Roche.
Aldogène.
Aniodol.
Boricine Meissonnier.
Brûleur Guasco.
Formolateurs Hélios.
Glutol.
Lusoforme.
Lysol.
Néol.
Novargan Heyden.
Pastilles de Formaline Hélios.
Perhydrol-Merck.
Phénol Bobœuf.
Protéinate d'argent Heyden.
Savons antiseptiques de F. Vigier.
Stérilisateurs Hélios.
Sublamine Schering.
Sulfoquinoline Sauter.
Tannoforme-Merck.
Thigénol Roche.
Vioforme Ciba.
Xéroforme Heyden.

ANTISEPTIQUES INTERNES-ANTITOXIQUES

Aniodol.
Collargol Heyden.
Electrargol.
Electrocuprol.
Electrosélénium.
Glycogène Clin.
Lycétol Vicario.
Peroxydine.
Pipérazine Midy.
Produits Midy au Collargol.
Tannismut Heyden.
Tannoforme-Merck.
Uraseptine Rogier.
Urisanine.
Urotropine Schering.

ARTÉRIO-SCLÉROSE

Algarine Nyrdahl.
Bi-Iodure Souffron.
Digitaline Cristallisée Nativelle.
Gui Byla.
Iode (Nyrdahl, Moride).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodone Robin.
Iodostarine Roche.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Lipoiodine Ciba.
Santhéose.
Trinitrine Vicario.
Vin Girard.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry.

ARTHRITISME, GOUTTE RHUMATISME, DIABÈTE, etc...

Acide Acétosalicylique Heyden.
Antialgos Christiaens.
Aspirine Vicario.
Bétul-Ol Midy.
Colchi-Sal Midy.
Colchique Byla.
Diabétifuge.
Exo-Hypophysine Byla.
Exo-Thyroïdine Byla.
Glycogène Clin.
Hypophysine Byla.
Liqueur Anti-Arthritique.
Liqueur Laville.
Lycétol Vicario.
Mélubrine.
Oxydothyrine Pâris.
Pipérazine Midy.
Pyramidon Creil.
Rhésal Vicario.
Ribes Nigrum Byla.
Saint-Galmier.
Salène Ciba.
Salit Heyden.
Santhéose.
Solurol.
Solutions du Dr Clin.
Sphérulines Thyroïdiennes Moncour.
Stronal.
Surrénaline Bouty.
Surrénine Byla.
Thyratoxine Byla.
Thyroïdine Bouty.
Thyroïdine Byla.
Ulmarène du Dr Gigon.
Ulmarène du Dr Gigon (Produits à l').
Uraseptine Rogier.
Vals

BRONCHES ET POUMONS

Æthone.
Alcarhène.
Antiasthme Bengalais.
Antigrippine Midy.
Aspirine Vicario.
Capsules Dartois.
Cigarettes Américaines Leroy.
Comprimés de Thiocol Roche.
Créosotal Heyden.
Dionine-Merck.
Dionine-Merck (Sirop et Tablettes du Dr Bousquet).
Eaux-bonnes.
Elatine Bouin.
Elbon Ciba.
Emulsion Marchais.
Exo-Pulmine Byla.
Gaïarsol Bouty.
Gouttes Nican.
Héroïne Vicario.
Narcyl Grémy.
Pantopon Roche.
Pastilles de Mackensie.
Phosphotal Clin.
Poudre Américaine Leroy.
Régénérateur Bouyer.
Salit Heyden.
Sirop Roche au Thiocol.
Sulfoléine Rozet.
Thiocol Roche.
Trinitrine Vicario.

CŒUR

Ampoules de Digalène.
Digalène.
Digifoline Ciba.
Digitale Byla.
Digitale (Intrait Dausse).
Digitaline Cristallisée Nativelle.
Diurène.
Dragées Nyrdahl à l'Ibogaïne.
Genêt Byla.
Ibogaïne.
Kola Midy.
Muguet Byla.
Santhéose.
Trinitrine Vicario.

(Voir aussi **Analgésiques Internes et Hypnotiques** *selon les cas).*

ESTOMAC

Amandol.
Antacidol.
Atural.
Cétrarose du Dr Gigon.
Citrosodine Grémy.
Elixir de Papaïne Byla.
Elixir de Pepsine Byla.
Exo-Gastrine Byla.
Gastérase Byla.
Gastérine Frémont.
Gastrosan Heyden.
Gastrozymase Bouty.
Pepsorthine.
Peptone Byla.
Pilules de Quassine Frémint.
Poudre Génia.
Pougues Saint-Léger.
Quina-Laroche.
Saint-Galmier.
Saturol.
Sauge Byla.
Sirop de Papaïne Byla.
Spérulines Gastriques Moncour.
Stronal.
Vals.

FOIE, PANCRÉAS, RATE

Biléyl Fournier.
Choléine Camus.
Cholèokinase.
Cholergine.
Citrosodine Grémy.
Eukénol.
Exo-Hépatine Byla.
Exo-Pancréatine Byla.
Extrait Biliaire Byla.
Glycogène Clin.
Hépatine Byla.
Hépato-Byl.
Jécol.
Pancréatine Byla.
Pilules Anti-Hépatiques du Dr Debouzy.
Pilules de Quassine Frémint.
Sphérulines Cholagogues Moncour.
Sphérulines Hépatiques Moncour.
Sphérulines Pancréatiques Moncour.
Splénine Byla.

GYNÉCOLOGIE

Airol Roche.
Aniodol.
Cérébrine.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Exo-Ovarine Byla.
Flavéine Byla.
Novarine Vicario.
Ovarine Byla.
Ovigénine Bouty.
Ovules Roche au thigénol.
Oxydovarine Pâris.
Péricols.
Placentine Byla.
Sphérulines Ovariennes Moncour.
Stypticine Merck.
Tampol Roche.
Thigénol Roche.

HÉMOSTATIQUES

Adrénaline Byla.
Adrénaline Clin.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Ergot de Seigle.
Gui Byla.
Hamameline Roya.
Hamamelis (Extrait fluide Dausse).
Hamamelis (Nyrdahl).
Hydrastis.
Penghawar Vicario.
Suprarénine Synthétique Creil.
Stypticine-Merck.

HYPNOTIQUES

Ampoules de Pantopon Roche.
Bibromure Vicario.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cachet Cépé.
Dionine-Merck.
Héroïne Vicario.
Narcyl Grémy.
Neurène.
Pantopon Roche.
Sédol.
Sirop d'Aubergier.
Sirops Henry Mure.
Solutions Henry Mure.
Tribromure de A. Gigon.
Valéral Puy .
Valériane Byla.
Valériane (Extrait fluide Dausse).
Valériane (Intrait Dausse).
Valérianose du Dr Gigon.
Valérobromine Legrand.
Valyl Midy.
Véronal.

INTESTINS

Agaryl Fournier.
Biolactyl.
Carabaña.
Cascara Midy.
Comprimés de Châtel-Guyon-Miraton.
Entérokinase Byla.
Eulactine Millet.
Exo-Pancréatine Byla.
Fixine Grémy.
Globules Tæniafuges de Secrétan.
Hordénine Lauth.
Lactobacilline.
Lactochol.
Lactolaxine Fydau.
Lactozimase B.
Laxatol.
Marron d'Inde (Intrait Dausse).
Paralactine Byla.
Pastilles Miraton-Châtel-Guyon.
Péristaltine Ciba.
Rectoline.
Scorogène.
Sphérulines entériques Moncour.
Suppositoires Adréno-Styptiques Midy.
Suppositoires d'Euproctol.
Tænifuge Kirn.
Tænifuge radical.
Tamar Indien Grillon.
Tannismut Heyden.
Tannoforme-Merck.
Thaolaxine.
Thigénol Roche.
Vals.
Varilaxine.
Véritables Grains de Santé du Dr Franck.

NERFS
(HYSTÉRIE, ÉPILEPSIE, etc...)

Acide Acétosalicylique Heyden.
Ampoules de Pantopon Roche.
Antialgos Christiaens.
Aspirine Vicario.
Bibromure Vicario.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin..
Bromone Robin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cérébrine.
Cérébrine Byla.
Dionine-Merck.
Héroïne Vicario.
Neurène.
Pantopon Roche.
Pyramidon Creil.
Sédol.
Sirop d'aubergier.
Sirops Henry Mure.
Solutions Henry Mure.
Tribromure de A. Gigon.
Trigémine Creil.
Valéral Puy.
Valériane Byla.
Valériane (extrait fluide Dausse).
Valériane (Intrait Dausse).
Valérianose du Dr Gigon.
Valérobromine Legrand.
Valyl Midy.
Véronal.
Véronidia Buisson.

OPHTALMOLOGIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE

Adrénaline Byla.
Adrénaline Clin.
Aniodol.
Antiasthme Bengalais.
Aspirine Vicario.
Cigarettes Américaines Leroy.
Cocaïne Midy.
Dionine-Merck.
Néol.
Novargan Heyden.
Novocaïne Creil.
Penghawar Vicario.
Poudre Américaine Leroy.
Suprarénine Synthétique Creil.
Tablettes d'Oxymenthol Perraudin.
Thigénol Roche.

OPOTHÉRAPIE

Choléine Camus.
Choléokinase.
Opothérapie Bouty.
Opothérapie Byla.
Opothérapie Fournier Frères.
Opothérapie Moncour.
Opothérapie Vigier.
Oxydothyrine Pâris.
Oxydovarine Pâris.
Pilules Anti-Hépatiques du Dr Debouzy.

PEAU, CUIR CHEVELU

Algarine Nyrdhal.
Baume Delacour.
Baume Duret.
Bi-Iodure Souffron.
Engelurol.
Iode (Moride, Nyrdahl).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodone Robin.
Iodostarine Roche.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Levurine Couturieux.
Lipoiodine Ciba.
Métharsol Bouty.
Méthylarsinate Vicario.
Ouataplasme Langlebert.
Sénophile.
Sparablanc Sauter.
Thigénol Roche.
Vin et Sirop de Moride.

RECONSTITUANTS
STIMULANTS, TONIQUES

Algarine Nyrdahl.
Ampoules Churchill indolores.
Biiocalcose Chevretin.
Biophorine Girard.
Capsules de Morrhuine Puy.
Dragées de F. Gille.
Dragées Nyrdahl à l'Ibogaïne.
Electromartiol.
Elixir de Propeptonefer Byla.
Exo-Orchitine Byla.
Feroxal.
Fer Rabuteau.
Fortossan Ciba.
Glycérophosphate Robin.
Gouttes de Propeptonefer Byla.
Hématol.
Hémoglobine Byla.
Hémostyl.
Hippoplasine Gran.
Hypophosphites Churchill.
Ibogaïne.
Kineurine Moncour.
Kola Midy.
Kolayo.
Lécithine Clin.
Lipochol Byla.
Lymphatine Byla.
Médication Arrhénique composée.
Médication Arrhénique simple.
Métharfer Bouty.
Métharsol Bouty.
Méthylarsinate Vicario.
Morrhuëtine Juncken.
Musculosine Byla.
Néobione Sauter.
Névrosthénine Freyssinge.
Nucléarsitol Robin.
Nucléatol Robin.
Nucléofer Girard.
Orchitine Byla.
Ostéohépatine.
Ovo-Lécithine Billon.
Panutrine Sauter.
Pepto-Fer Jaillet.
Peptone Byla.
Peroxydine.
Phosféryl Fournier.
Phytine Ciba.
Pougues.
Quina-Laroche.
Séquardine Bouty.
Sirop de F. Gille.
Sirop d'Hémoglobine Byla.
Toni-Lécithine Rogier.
Tonikéine Chevretin.
Tricalcine.
Trixyl Fraudin.
Vin Girard.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry

SYPHILIS

Algarine Nyrdahl.
Arsénobenzol Billon.
Bi-iodure de Mercure Midy.
Bi-iodure Souffron.
Curgol Vicario.
Elixir Déret.
Enésol.
Huile grise stérilisée F. Vigier.
Iode (Moride, Nyrdahl).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodone Robin.
Iodostarine Roche.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Lipoiodine Ciba.
Néosalvarsan.
Nucléarsitol Robin.
Salvarsan.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry.

SYSTÈME VEINEUX

Elixir de Virginie Nyrdahl.
Hamameline Roya.
Hamamelis (Extrait fluide Dausse).
Hamamelis (Nyrdahl).
Varicure Marck.